

*/Version 7.2, 12/2008/*



## **REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

## **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Orbeseal, suspensie intramamară pentru vaci de lapte în perioada de repaus mamar

## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

Fiecare seringă de 4 g contine:

### **Substanța activă:**

Subnitrat de bismut, greu 2,6 g

**Excipienti:** q.s 4 g

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Suspensie intramamară (de culoare gri-albă, pasta fină, uleioasă))

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă**

Bovine (vaci de lapte)

### **4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Prevenirea de noi infectii intramamare pe parcursul perioadei de repaus mamar.

La vacile considerate indemne de mastita subclinica, Orbeseal poate fi utilizat in controlul mastitelor si managementul perioadei de repaus mamar.

Selectia bovinelor pentru tratamentul cu Orbeseal trebuie sa se bazeze pe o investigatie prealabila a medicului veterinar.Criteriul de selectivitate ar trebui sa fie stabilit in functie de gravitatea mastitei si istoricul fiecarei vaci in parte,sau pe probe-test recunoscute pentru detectarea mastitelor subclinice sau testare bacteriologica.

### **4.3 Contraindicații**

Vezi secțiunea 4.7.

Nu folositi produsul singur la vacile cu mastite subclinice in perioada de repaus mamar. Nu folositi la vacile cu mastite clinice in perioada de repaus mamar.

### **4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

Nu sunt.

### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

#### **Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Este o practica buna observarea vacilor in perioada de repaus mamar ,in mod frecvent, pentru a evidenția semnele mastitei clinice.

In cazul in care unul din sferturile mamare dezvoltă mastita clinica,sfertul mamar respectiv va trebui sa fie golit manual inainte de a se instaura terapia necesara.

Pentru a reduce riscul contaminarii nu introduceti seringa in apa.

Folositi seringa o singura data.

Este important sa se respecte o tehnica stricta aseptica pentru administrarea de Orbeseal, deoarece produsul nu are acitivitate antimicrobiana.

Nu administrati ~~orică~~ alt produs intramamar, dupa administrarea de Orbeseal.

La vacile care pot avea mastita subclinica ,Orbeseal poate fi folosit dupa administrarea unei antibiototerapii a sfertului infectat.

#### **Precăutii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Spălați mâinile după utilizarea produsului.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Nu se cunosc.

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație sau lactație**

##### *Perioada de gestatie:*

Deoarece produsul nu este absorbit după infuzia intramamară, Orbeseal poate fi folosit la animalele

gestante: La fătare, produsul poate fi ingerat de vițel. Ingestia de Orbeseal la vițel este sigură și nu

produce efecte adverse.

##### *Perioada de lactatie:*

Orbescal este contraindicat in perioada de lactatie.Daca este folosit accidental la o vaca in lactatie, se observa o crestere tranzitorie (de 2 ori) a celulelor somatice.Intr-un astfel de caz se curata produsul manual , nu sunt necesare precautii suplimentare.

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

In studiile clinice, compatibilitatea Orbeseal a fost demonstrată doar cu preparate ce contin cloxaciclin in perioada de repaus mamar.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Numai pentru infuzie intramamara.

Infuzati continutul unei seringi de Orbeseal in fiecare sfert mamar imediat dupa ultima mulsoare (la repaus mamar).Nu masati mamelonul sau ugerul dupa infuzarea produsului.

Pentru a reduce riscul mastitelor post-infuzie, trebuie avut grija sa nu se introduca agenti patogeni in mamelon in timpul infuzarii produsului,

Este esențial ca mamelonul sa fie bine curatat si dezinfecțiat,cu spirt medicinal sau servetele impregnate in alcool.Mamelonul trebuie curatat pana cand servetele nu mai sunt vizibil murdare.Mameloanele ar trebui sa fie lasate sa se usuce inainte de perfuzare.Infuzati aseptic si aveți grija sa nu contaminati duza seringii.Dupa infuzare este recomandabil sa se foloseasca o curatare a mamelonului prin imbaiere sau pulverizare.

#### **4.10 Supradoxare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Nu au fost observate reactii adverse la vaci, dupa administrarea a de doua ori doza recomandata.

#### **4.11 Timp de așteptare**

Carcne:Zero zile.

Lapte:Zero zile.

## **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

Grupa farmacoterapeutică: Diferite produse pentru mameloane și uger.  
Cod ATC vet: QG52X

### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Infuzarea de Orbeseal în fiecare sfert mamar produce o barieră fizică împotriva patrundерii bacteriilor, reducând astfel incidenta noilor infectii în perioada de repaus mamar.

### **5.2 Particularități farmacocinetice**

Subnitratul de bismut nu este absorbit de glanda mamara, dar inchide etans și ramane în mamelon pana este eliminat fizic ( prezent la vacile în perioada de repaus mamar pana la 100 de zile).

## **6. PARTICULARITATI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipientilor**

Parafină lichidă  
Di Tri Stearat de aluminiu  
Silice coloidală anhidră

### **6.2 Incompatibilități**

Nu se cunosc.

### **6.3 Perioadă de valabilitate**

Valabilitatea produsului medicinal veterinar, așa cum este ambalat pentru comercializare: 5 ani.

### **6.4 Precauții speciale pentru depozitare**

Fara precautii speciale de depozitare.

### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

O seringă intramamara, doza unică, continand 4 g de pasta intramamara alb-gri.

Ambalaj primar: Seringă din polietilena de densitate scazuta cu o duza avand suprafața netedă, conică, inchisa ermetic.

Forme de prezentare: cutii de 24, 60 si 120 seringi.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1,  
1348 Louvain-la-Neuve,  
Belgia

## **8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

**INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.



## ETICHETARE ȘI PROSPECT

**A. ETICHETARE**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton ce conține 24 de seringi

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton ce conține 60 de seringi

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de carton ce conține 120 de seringi

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Orbeseal**, suspensie intramamară pentru vaci de lapte în perioada de repaus mamar

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

Fiecare seringă conține 4g de pasta intramamara cu 65% Subnitrat de bismut

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Suspensie intramamară.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

24 seringi

60 seringi

120 seringi

**5. SPECII TINTĂ**

Bovine (vaci de lapte în perioada de repaus mamar)

**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Orbeseal este indicat pentru prevenirea de noi infectii intramamare pe parcursul perioadei de repaus mamar.Este o terapie care nu utilizeaza antibiotice .Previne noile infectii intramamare in timpul perioadei de repaus mamar cu o perioada de asteptare de zero zile pentru lapte si carne.  
Se recomanda ca Orbeseal sa fie utilizat ca fiind parte a unei abordari de turma, pentru managementul vacilor in repaus mamar si pentru controlul mastitelor.

La vacile considerate inderne de mastita subclinica, Orbeseal poate fi utilizat in perioada de repaus mamar.Alte animale ar trebui sa fie monitorizate in conformitate cu un plan de control al mastitei,aprobat sau sub recomandarea medicului veterinar.

Selectia vacilor pentru tratament trebuie sa se bazeze pe o investigatie prealabila a medicului veterinar. Ca metoda de ghidare,atunci cand numaratoarea de celule individuale este disponibila,vacile care au o medie a numarului de celule mai mica de 200,000 celule/ml, inainte de repausul mamar, pot fi tratate cu Orbeseal.O crestere usoara a numarului de celule in ultimele 4 saptamani inainte de repausul mamar este normala si poate fi ignorata.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE****Doza si administrare**

Numai pentru infuzie intramamara.

**Sfaturi pentru proprietar-ESTE IMPORTANT SA CITITI PROSPECTUL DEOARECE OFERA RECOMANDARI PRIVIND TEHNICILE ASEPTICE FOLOSITE INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI.**

**Doza:**O seringă în fiecare sfert mamar imediat după ultima mulsoare (în perioada de repaus mamar). Nu masati mamelonul sau ugerul după infuzarea produsului.

**Administrare:**

Infuzia intramamara trebuie să fie aseptica când se administrează acest produs.

**8. TIMP DE AȘTEPTARE**

Timp de așteptare: Carne și Lapte: zero zile

**9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

**Contraindicatii, atentionari speciale:**

Nu folositi produsul singur la vacile cu mastite sub clinice în perioada de repaus mamar. La vacile care pot avea mastita subclinica, Orbeseal poate fi folosit după administrarea unei antibioterapii a sfertului infectat. În studiile clinice compatibilitatea lui Orbeseal a fost demonstrată doar cu cloxaciclin. Nu folositi la vacile cu mastite clinice în perioada de repaus mamar. La fel ca toate tratamentele intramamare, este o practica buna observarea vacilor în perioada de repaus mamar, în mod frecvent, pentru a evidenția semnele mastitei clinice. În cazul în care unul din sferturile mamare dezvoltă mastita clinica, sfertul mamar respectiv va trebui să fie golit manual înainte de a se instaura terapia necesara. Este contraindicat în perioada de lactatie. Dacă este folosit accidental la o vacă în lactație se curată produsul manual. Nu sunt necesare precautii suplimentare. Pentru a reduce riscul contaminării nu introduceți seringa în apă. Folosiți seringa o singura dată. Nu administrați orice alt produs intramamar după administrarea de Orbeseal.

**Avertizare pentru utilizator:**

Spălați mâinile după utilizarea produsului.

**10. DATA EXPIRĂRII**

EXP {month/year}

**11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

În condiții de frig produsul poate fi încalzit la temperatura camerei, într-un mediu caldut, pentru a ajuta la infuzare. Nu introduceți seringa în apă.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Eliminarea: Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele legislative în vigoare.

**13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe baza de reteta veterinara.


**14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ SI VEDEREA COPIILOR”**

A nu se lăsa la îndemână și vedere copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve,  
Belgia



**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**17. NUMĂRUL DE FABRICАTIE AL SERIEI DE PRODUS**

<Batch> <Lot> <BN> {number}

**INFORMATII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

Eticheta seringi

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Orbeseal ,suspensie intramamară pentru vaci de lapte în perioada de repaus mamar

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

Fiecare seringă conține 4g de pasta intramamara cu 65% Subnitrat de bismut

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

4 g

**4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**

Suspensie intramamară.

**5. TIMP DE AȘTEPTARE**

Timp de așteptare: Carne și Lapte: zero zile

**6. NUMĂRUL SERIEI**


< Serie> < Lot> < BN>{număr}

**7. DATA EXPIRĂRII**

< EXP {lună/an}>

**8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.



## B. PROSPECT

## PROSPECT

**Orbeseal, suspensie intramamară pentru vaci de lapte în perioada de repaus mamar**

### **1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

#### Deținătorul autorizației de comercializare

##### **Zoetis Belgium SA**

Rue Laid Burniat 1,  
1348 Louvain-la-Neuve,  
Belgia

#### Producător pentru eliberarea seriei:

##### **Cross Vetpharm Group Ltd,**

Dublin 24  
Irlanda

##### **Haupt Pharma Latina S.r.l**

Borgo S Michelle (LT),  
SS 156, Km 50,  
Latina  
Italia

### **2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Orbeseal, suspensie intramamară pentru vaci de lapte in perioada de repaus mamar**

### **3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDENȚI)**

Orbeseal este o pasta gri-alba fina. Se prezinta in seringi de 4 g suspensie intramamara continand 65% Subnitrat de bismut.

### **4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Orbeseal este indicat pentru preventirea de noi infectii intramamare pe parcursul perioadei de repaus mamar.Este o terapie care nu utilizeaza antibiotice .Previne noile infectii intramamare in timpul perioadei de repaus mamar cu o perioada de asteptare de zero zile pentru lapte si carne.

Se recomanda ca Orbeseal sa fie utilizat ca fiind parte a unei abordari de turma, pentru managementul vacilor in repaus mamar si pentru controlul mastitelor.

La vacile considerate indemne de mastita subclinica, Orbeseal poate fi utilizat in perioada de repaus mamar.Alte animale ar trebui sa fie monitorizate in conformitate cu un plan de control al mastitei,aprobat sau sub recomandarea medicului veterinar.

Selectia bovinelor pentru tratamentul cu Orbeseal trebuie sa se bazeze pe o investigatie prealabila a medicului veterinar. Ca metoda de ghidare,atunci cand numaratoarea de celulele individuale este disponibila,vacile care au o medie a numarului de celule mai mica de 200,000 celule/ml, inainte de repausul mamar, pot fi tratate cu Orbeseal.O crestere usoara a numarului de celule in ultimele 4 saptamani inainte de repausul mamar este normala si poate fi ignorata.

### **5. CONTRAINDIICAȚII**

Nu folositi produsul singur, la vacile cu mastite subclinice in perioada de repaus mamar.

Nu folositi la vacile cu mastite clinice in perioada de repaus mamar.

Nu folositi la vacile in lactatie.Daca este folosit accidental la o vaca in lactatie, se observa o crestere tranzitorie (de 2 ori) a celulelor somatice.Intr-un astfel de caz se curata produsul manual si nu sunt necesare precautii suplimentare.

Nu administrati orice alt produs intramamar dupa administrarea de Orbeseal.

## 6. REACTII ADVERSE

Daca observati reactii grave sau alte efecte secundare care nu sunt mentionate in acest prospect, va rugam informati medicul veterinar.

## 7. SPECII TINTĂ

Bovine (vaci de lapte).

### 8.1 POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

#### Dozaj si administrare

Numai pentru infuzie intramamara.

Doza: O seringa in fiecare sfert imediat dupa ultima mulsoare (in perioada de repaus mamar). Nu masati mamelonul sau ugerul dupa infuzarea produsului.

#### Administrare:

Trebuie avut grija sa nu se introduca agenti patogeni in mamelon. Este important sa se respecte o stricta tehnica aseptica pentru administrarea de Orbeseal, deoarece produsul nu are activitate antimicrobiana.

1. Toate mameloanele trebuie dezinfecțiate cu atenție înainte de infuzarea Orbeseal. Asigurati-vă destul de timp pentru a trata fiecare animal în parte. Nu combinati aceasta practica cu alte activitati zootehnice.

2. Asigurati-vă ca animalele sunt imobilizate în mod corespunzător în condiții de igienă. Pastrati seringile curate și NU le introduceti în apă.

3. Ar trebui folosita o pereche de manusi de unica folosinta pentru tratamentul fiecarui animal in parte.

4. Incepeti cu un mamelon vizibil curatat și uscat. Daca mameloanele sunt vizibil murdare, curatati mizeria din jurul lor, cu prosoape de hartie de unica folosinta umede și uscati bine. Inmuiati mamelonul și lasati sa actioneze timp de 30 de secunde, apoi stergeti fiecare mamelon cu servetele de unica folosinta, pana ce este complet uscat. Evacuati laptele intr-o cană și apoi aruncati-l.

5. Dezinfecțiați cu atenție întreaga suprafață a mamelonului cu un servetel inmisiat în alcool sau spirit. Studiile indică cel mai eficient mod de curătare ca fiind folosirea unor tamponi preparate recent din bumbac inmisiate în spirit medicinal (sau echivalentul spiritului). Daca acest lucru nu este posibil, pot fi folosite tamponi sterile furnizate. Curatati mameloanele cat mai departe de dumneavoastra, pentru a evita contaminarea tamponelor sterile.

6. Cu delicateitate îndepărtați impuritățile de pe fiecare mamelon cu tamponi sterile inmisiate în alcool/spirit pana cand ambele sunt complet curate.

7. Scoateți capacul tubului intramamar, având grija să nu atingeți duza. Infuzati continutul seringii în mamelon, evitand contaminarea acestuia. Infuzati mameloanele în ordinea inversă curătării, de exemplu: tratati mai intai sfertul cel mai apropiat de dumneavoastra. Nu masati ugerul.

8. Aplicati pe mamelon un dezinfector post-mulgere si duceti animalele tratate intr-o curte, unde vor sta cel putin 30 de minute pentru a permite inchiderea canalului mamelonului.

La fătare, ingestia de Orbeseal la vițel este sigura și nu produce efecte adverse.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

### Avertizare pentru utilizator:

Este important sa cititi instructiunile inainte de a utiliza acest produs.

Trebuie avut grija pentru a mentine curătenia atunci cand se administreaza Orbeseal, in scopul reducerii riscului mortalitatii prin mastite post-infuzare.

Sfaturi complete cu privire la tehnica de curatare a mamei inainte de intubare sunt incluse in instructiunile de utilizare si ar trebui sa fie urmate cu strictete.

## 10. TIMP DE AȘTEPTARE

Timp de asteptare: Carne si Lapte: zero zile.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acet produs medicinal veterinar un necesita conditii speciale de depozitare.

## 12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

La vacile care pot avea mastita subclinica, Orbescal poate fi folosit dupa administrarea unei antibioterapii a sfertului infectat. In studiile clinice compatibilitatea lui Orbeseal a fost demonstrata doar cu cloxaciclin. La fel ca toate tratamentele intramamare, este o practica buna ,observarea vacilor in perioada de repaus mamar ,in mod frecvent, pentru a evidenția semnele mastitei clinice. In cazul in care unul din sferturile mamare dezvolta mastita clinica,sfertul mamar respectiv va trebui sa fie golit manual inainte de a se instaura terapia necesara.

Folositi seringa o singura data.

Pentru a reduce riscul contaminarii nu introduceti seringa in apa.

Spălați mâinile după utilizarea produsului.

Deoarece produsul nu este absorbit post infuzare,Orbeseal se poate utiliza la animalele gestante.

Numai pentru uz veterinar.

## 13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea:Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerințele legislative in vigoare.

## 14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

## 15. ALTE INFORMAȚII

Majoritatea produselor care inchid etans ies la prima mulsoare sau datorita efectului sugarului asupra mamei,se mai pot observa mici cantitati de produs, pentru cateva zile (ca mici pete pe filtru). Orbeseal poate fi diferențiat de mastita prin textură pe căre acăsta o are.De două ori doza recomandată a fost administrată la vaci, fară a avea însă efecte secundare.In condiții de frig, produsul poate fi încălzit la temperatură camerei, într-un mediu cald pentru a ajuta infuzarea.

Dupa fatare sunt recomandate urmatoarele etape pentru o eliminare eficienta a produsului,pentru a minimaliza intrarea de produs rezidual in masina de muls.Masina de muls nu ar trebui sa fie utilizata pentru eliminarea de Orbeseal din mamelon.

- 1.Ciupiti mamelonul de 10-12 ori inainte de primul muls.
- 2.Pentru primele mulsori: verificati daca produsul contine material rezidual.
- 3.Verificati filtrele dupa fiecare muls, pentru a nu avea produs rezidual.

Cutii de 24, 60 si 120 seringi

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Numai pentru uz veterinar. Se elibereaza numai cu reteta veterinara.

**Zoetis România SRL**

Willbrook Platinum Business & Convention Center

Sos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 172-176, Corp B, Etaj 5,

Sector 1, 013686, Bucureşti, România

Tel: + 40 21 207 17 70

Fax: + 40 21 207 17 71

