

## 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OXYVET spray, 3,5 g/150g, spray cutanat, suspensie pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici

## 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare tub (spray) de 150 g conține:

### Substanță activă:

Oxitetraciclină clorhidrat ..... 3,5 g

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray cutanat, suspensie de culoare albastră-verde

## 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

### 4.1 Specii țintă

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici

### 4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Produsul este indicat pentru utilizare topică la cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, câini și pisici în tratamentul infecțiilor pielii, ongloanelor (panarițiu), mameloanelor, buzelor și în general în toate infecțiile superficiale ale pielii produse de bacterii susceptibile la acțiunea substanței active. Este de asemenea recomandat în tratamentul arsurilor la nivelul pielii, al infecțiilor post – chirurgicale și al excoriațiilor.

### 4.3 Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

### 4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

### 4.5 Precauții speciale pentru utilizare

#### Precauții speciale pentru utilizare la animale

A se evita pulverizarea în ochi sau în jurul ochilor.  
Protejați ochii animalului când pulverizați în apropierea capului. Curățați bine zona afectată înainte de a pulveriza produsul. Produsul trebuie utilizat după efectuarea testelor de susceptibilitate, luând în considerare politicile antimicrobiene oficiale și locale. Animalul trebuie împiedicat să-și lingă zona tratată, precum și zonele tratate ale altor animale.

## **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

În caz de hipersensibilitate cunoscută la tetracicline, evitați contactul direct cu pielea sau inhalarea de vapori.

Datorită riscului de sensibilizare și de dermatită de contact, utilizatorul trebuie să evite contactul cu pielea. Purtați mănuși impermeabile adecvate când manipulați produsul. Datorită riscului de iritare a ochilor, contactul cu ochii trebuie evitat. Protejați-vă ochii și fața. Nu pulverizați produsul pe o flacără deschisă sau pe un material incandescent. Nu perforați sau nu ardeți tubul, nici măcar după utilizare. Evitați să inhalați vaporii. Aplicați produsul în aer liber sau într-o zonă bine aerisită. Spălați-vă mâinile după utilizare. Nu mâncați și nu fumați în timp ce administrați produsul. În caz de ingestie accidentală sau în caz de contact cu ochii solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului eticheta.

### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Nu sunt cunoscute.

### **4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat**

Nu este cazul.

### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu există date disponibile privind interacțiunile cu alte produse medicinale veterinare.

### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Produsul se utilizează prin aplicare topică, prin pulverizare o dată sau de două ori pe zi a zonei afectate, până la vindecarea completă. În cazurile severe (ca panarițiu, gangrena podală), anterior aplicării produsului se va interveni pentru debridarea chirurgicală. Agitați bine flaconul înainte de pulverizare.

### **4.10. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)**

Nu este cazul.

### **4.11 Timp de așteptare**

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine:

Carne și organe: 0 zile

Lapte: 0 zile

## **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

Grupa farmacoterapeutică: antibiotice pentru uz topic

Codul veterinar ATC: QD06AA03

### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Tetraciclinele acționează prin inhibarea sintezei de proteine la microorganismele sensibile. Tetraciclinele intră în citoplasma celulei prin difuzie din exteriorul membranei celulare și apoi în interiorul citoplasmei printr-un proces activ de transport

mediat. Aflat în interiorul citoplasmei, tetraciclinele se leagă ireversibil de receptorii subunității ribozomale 30 a bacteriei, din acest motiv interferă cu legarea de ARN aminoacil-transferaza la locul de legare pe complexul ARN ribozomal. Aceste legături previn legarea de aminoacizi la lanțul de peptide, inhibând sinteza de proteine bacteriene. Tetraciclinele sunt bacteriostatice, dar în concentrații mari sunt bactericide.

Tetraciclinele sunt în general considerate sigure pentru animale. Ele sunt eficiente împotriva bacteriilor Gram pozitive și bacteriilor Gram negative, chlamidii, rickettsii, actinomicete, spirochete și câteva protozoare (amibe). Cele mai sensibile bacterii la tetracicline sunt *Streptococci beta-hemolitici*, *Streptococci non-hemolitici*, *Clostridile*, *Brucella*, *Haemophilus* și *Klebsiella*.

Aplicată local, oxitetraclina este un antibiotic cu spectru larg. Este eficientă împotriva bacteriilor Gram pozitive și Gram-negative inclusiv *Bacillus* spp., *Corynebacterium* spp., *Clostridium* spp., *Fusiformis*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., câteva specii de micoplasme, chlamidii, rickettsii și protozoare, responsabile pentru infecții ale pielii.

## 5.2 Particularități farmacocinetice

OXYVET spray este utilizat doar pentru aplicare locală, nu este absorbit în circulația sistemică și are o acțiune locală eficientă împotriva microorganismelor.

## 6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipienților

Aerosol OT(docusat de sodiu)  
Izopropil miristat  
Polisorbat 80  
Patent blue V  
Alcool izopropilic  
Gaz propulsor (propan și butan).

### 6.2 Incompatibilități majore

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

### 6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

### 6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se evita expunerea la lumină solară directă și la temperaturi mai mari de 25°C.  
Flacon sub presiune.

A nu se perfora sau arde, nici chiar după utilizare.

A nu se pulveriza în apropierea flăcărilor deschise sau a oricărui alt material incandescent. A se feri de sursele de aprindere. Fumatul interzis. **Inflamabil!**

## **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

Produsul este ambalat într-un tub (spray) de 150 g (250 ml) din aluminiu (lăcuit) cu supapa de pulverizare și capac de protecție.

## **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

PROVET S.A. (PROVET COMPANY FOR PRODUCTION OF VETERINARY PRODUCTS SINGLE MEMBER S.A.)

Eleftherias Avenue 120,

Eleousa, Zitsa, Ioannina, 45500

Tel.: +30 2105575770-3

Fax: +30 2105508500

E-mail: vet@provet.gr

GRECIA

## **8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data primei autorizări: 16.02.1996

Data ultimei reînnoiri: 08.05.2015

## **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

## **INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR, ETICHETA ȘI PROSPECT COMBINATE**  
**Tub (spray) de 150 g**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

OXYVET spray, 3,5 g/150g, spray cutanat, suspensie pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE**

1 tub (spray) de 150 g conține:  
**Substanță activă:**  
Oxitetraciclină clorhidrat .....3,5 g

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Spray pentru aplicare cutanată.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Tub x 150 g (250 ml)

**5. SPECII ȚINTĂ**

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

**6. INDICAȚII**

Produsul este indicat pentru utilizare topică la cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, câini și pisici în tratamentul infecțiilor pielii, ongloanelor (panarițiu), mameloanelor, buzelor și în general în toate infecțiile superficiale ale pielii produse de bacterii susceptibile la acțiunea substanței active. Este de asemenea recomandat în tratamentul arsurilor la nivelul pielii, al infecțiilor post – chirurgicale și al excoriațiilor.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Produsul se utilizează prin aplicare topică, prin pulverizare o dată sau de două ori pe zi a zonei afectate, până la vindecarea completă. În cazurile severe (ca panarițiu, gangrena podală), anterior aplicării produsului se va interveni pentru debridarea chirurgicală. Agitați bine flaconul înainte de pulverizare.

**8. TIMP DE AȘTEPTARE**

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine:  
Carne și organe: 0 zile  
Lapte: 0 zile

## 9. ATENȚIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ

### **Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă** **NU există.**

#### **Precauții speciale pentru utilizare**

##### **Precauții speciale pentru utilizare la animale**

A se evita pulverizarea în ochi sau în jurul ochilor.

Protejați ochii animalului când pulverizați în apropierea capului. Curățați bine zona afectată înainte de a pulveriza produsul. Produsul trebuie utilizat după efectuarea testelor de susceptibilitate, luând în considerare politicile antimicrobiene oficiale și locale. Animalul trebuie împiedicat să-și lingă zona tratată, precum și zonele tratate ale altor animale.

##### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

În caz de hipersensibilitate cunoscută la tetracicline, evitați contactul direct cu pielea sau inhalarea de vapori.

Datorită riscului de sensibilizare și de dermatită de contact, utilizatorul trebuie să evite contactul cu pielea. Purtați mănuși impermeabile adecvate când manipulați produsul. Datorită riscului de iritare a ochilor, contactul cu ochii trebuie evitat. Protejați-vă ochii și fața. Nu pulverizați produsul pe o flacără deschisă sau pe un material incandescent. Nu perforați sau nu ardeți tubul, nici măcar după utilizare. Evitați să inhalați vaporii. Aplicați produsul în aer liber sau într-o zonă bine aerisită. Spălați-vă mâinile după utilizare. Nu mâncați și nu fumați în timp ce administrați produsul. În caz de ingestie accidentală sau în caz de contact cu ochii solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului eticheta.

##### **Gestație și lactație**

Nu este cazul.

##### **Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu există date disponibile privind interacțiunile cu alte produse medicinale veterinare.

##### **Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)**

Nu este cazul.

##### **Incompatibilități**

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

## 10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

## 11. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.



## 12. REACȚII ADVERSE

Nu sunt cunoscute.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

## 13. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se evita expunerea la lumină solară directă și la temperaturi mai mari de 25°C.

Flacon sub presiune.

A nu se perfora sau arde, nici chiar după utilizare.

A nu se pulveriza în apropierea flăcărilor deschise sau a oricărui alt material incandescent. A se feri de sursele de aprindere. Fumatul interzis. **Inflamabil!**



A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

## 14. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## 15. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRIȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE

Numai pentru uz veterinar - se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

## 16. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

## 17. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

## 18. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie

Lot

## 19. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ ETICHETA

## 20. ALTE INFORMAȚII

Produsul este ambalat într-un tub (spray) de 150 g (250 ml) din aluminiu (lăcuit) cu supapa de pulverizare și capac de protecție.

**21. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE  
COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE,  
RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS**

Deținătorul autorizației de comercializare:

PROVET S.A. (PROVET COMPANY FOR PRODUCTION OF VETERINARY  
PRODUCTS SINGLE MEMBER S.A.)

Eleftherias Avenue 120,

Eleousa, Zitsa, Ioannina, 45500

Tel.: +30 2105575770-3

Fax: +30 2105508500

E-mail: [vet@provet.gr](mailto:vet@provet.gr)

GRECIA

Producător responsabil pentru eliberarea seriei

PROVET S.A. (PROVET COMPANY FOR PRODUCTION OF VETERINARY  
PRODUCTS SINGLE MEMBER S.A.),

Nikiforou Foka & Agion An,

19 300 ASPROPYRGOS, ATENA,

Tel.: +30 210 55.75.770-3,

Fax: +30 210 55.75.830,

GRECIA

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să  
contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

SC MARAVET S.A., str. Maravet nr.1, Baia Mare, 430016, Tel/Fax: +40 262 211 964,

e-mail: [office@maravet.com](mailto:office@maravet.com)