

PANGOLAMIN injectable**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR****I. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE
COMERCIALIZARE ȘI DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE
RESPONSABIL DE ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ ESTE DIFERIT**Deținătorul autorizației de comercializare:

PROVET S.A.
77, Posidonos Avenue
GR 174 55 Alimos, Attiki, Grecia
Tel.: +30 2105575770-3
Fax: +30 2105575830
E-mail: vet@provet.gr

Producător pentru eliberarea seriei:

ALAPIS S.A.
19 300 ASPROPYRGOS.
ATENA, GRECIA

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
PANGOLAMIN injectabil****3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

1 ml conține

Substanța activă: PROCAIN PENICILINA G 300 000 U.I.

Excipienți:

ester metilic al acidului 4-hidroxibenzoic, citrat de sodiu dihidrat, lecitin, Polivinil pirolidonă, sare de etilenediamina tetra disodică de acid acetic, tiosulfat de sodiu, 5H₂O, dihidrogen fosfat de potasiu. Apă pentru preparate injectabile.

4. INDICAȚII

Pangolamin este indicat în tratamentul infecțiilor cauzate sau asociate cu bacterii sensibile la penicilină. Este în principal indicat pentru tratamentul mastitelor, infecțiilor sistemice și locale ale tuturor speciilor determinate de streptococi, stafilococi și *Corynebacterium pyogenes*. Este de asemenea utilizat pentru tratamentul pielonefritelor și actinomicozelor la bovine, rujetului la suine, nefritelor leptospirice și avortului vibrioni.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra la animale cunoscute cu hipersensibilitate la penicilină și cefalosporine.
A nu se administra Pangolamin intravenos.


6. REACȚII ADVERSE

Reacții de hipersensibilitate, edem trecător și durere la locul administrării intramusculare. Voma și anorexie pasageră la purcei sugari și la cei la îngrășat.

Ocazional pot apărea reacții alergice după administrarea de penicilină. Antihistaminicele și adrenalina ajută la revenirea din astfel de situații.

Dacă se observă orice alt efect nemenționat în acest prospect vă rugăm informați medicul dumneavoastră veterinar.





7. SPECII TINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porci, câini, pisici.

8. DOZE RECOMANDATE PENTRU FIECARE SPECIE ÎN PARTE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Procain penicilina se administrează în doze de la 5000 la 25000 U.I./kg g.v. în cazuri grave și în infecții acute doza poate fi crescută și/sau repetată la intervale mai frecvente în funcție de sfatul medicului. PANGOLAMIN poate fi administrat în următoarele doze:

- BOVINE, CABALINE : 1 - 2.5 ml / 50 kg g.v.
- VITEI, SUINE, OVINE, CAPRINE : 1 - 2 ml / 25 kg g.v.
- CIINI, PISICI : 1 ml / 12 kg g.v.

Se administrează intramuscular și se repeta la 24 de ore. Se poate utiliza pe cale intramamară la bovine, ovine și caprine, în următoarele doze :

- VACI 3 - 5 ml / sfert;
- OL. CAPRE 1.5 ml / mamelon.

A se agita înainte de utilizare.

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Nu este cazul.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne bovine	5 zile
ovine, caprine	5 zile
suine	5 zile
Lapte:	96 ore

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în locuri uscate și răcoroase, ferit de lumină.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni.

12. ATENTIONARE SPECIALĂ

Nu este cazul.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ

Întrebați medicul dumneavoastră veterinar cum să îndepărtați produsele medicinale neutilizate. Aceste măsuri pot ajuta la protecția mediului.

14. ALTE INFORMATII

Grupa farmacoterapeutică: Antibacteriene beta-lactamice, peniciline, codul veterinar ATC: QJ01CE09

MOD DE AMBALARE: flacoane de 20 ml și 100ml.

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar vă rugăm contactați reprezentantul local sau deținătorul autorizației de comercializare.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

produs medicinal veterinar supus prescripției

