



Romvac  
Company S.A.

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

### PARAMIXOVACOL

#### 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vaccinul PARAMIXOVACOL este un produs imunologic veterinar inactivat, constituit din suspensie de paramixovirus tip 1, tulpina PMV 1-RO 96, izolată de la porumbei și cultivată pe ouă embrionate de găină cu titrul minim înainte de inactivare de  $10^9$  DIE<sub>50</sub>/ml.

#### 2. COMPOZIȚIA PRODUSULUI

Fiecare doză vaccinală conține:

- antigenul specific – suspensie de paramixovirus tip 1, tulpina PMV 1 - RO 96, izolată de la porumbei și cultivată pe ouă embrionate de găină cu titrul minim înainte de inactivare de $10^9$ DIE <sub>50</sub> /ml .....	15%
- adjuvant mineral .....	80%
- ulei mineral ușor	
- Montanide ISA 70	
- emulgator - Span 80 .....	5%
- inactivant – aldehidă formică p.a sol 37%.....	maxim 0,5%

#### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Vaccinul PARAMIXOVACOL se prezintă sub formă de emulsie alb-lăptoașă care prin depozitare la 2–8°C se poate separa în două faze și care prin agitare se omogenizează ușor.

#### 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

##### 4.1. Specii țintă

Porumbei.

##### 4.2. Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă

Vaccinul PARAMIXOVACOL se folosește în profilaxia specifică a paramixovirozei la porumbei.

Imunitatea se instalează după 21 de zile. Durata imunității depinde de starea de sănătate și întreținere a păsărilor, fiind de regulă de minim 6 luni.

##### 4.3. Contraindicații


Nu se va efectua vaccinarea în focare evolutive de boli infecțioase.

Nu se vor vaccina păsările tarate, cu stare proastă de întreținere, cu boli nutrițional-metabolice, parazitate sau purtătoare de germeni condiționat patogeni care pot avea un răspuns imun necorespunzător.

Nu se vor vaccina porumbeii tineri sub vârstă de 6-8 săptămâni.

##### 4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu sunt.



#### **4.5. Precauții speciale pentru utilizare**

##### **Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Vaccinarea cu PARAMIXOVACOL se face după cel puțin o administrare pe cale oculoconjunctivală de vaccin antipseudopestos aviar Avipestisota.

Cu cel puțin două săptămâni înainte de vaccinarea cu PARAMIXOVACOL se va face deparazitarea internă (cu Flagelstop sau Rombendazol) și externă (cu Romparatox). Se recomandă efectuarea de tratamente antistress cu Complex Polivitaminic Buvabil cu 2-3 zile înainte și 2-3 zile după vaccinare.

Porumbeii adulți se vaccinează cu cel puțin 14 zile înainte de concursuri, expoziții sau împerechere.

Păsările cu boli nutrițional metabolice, parazitare sau purtătoare de germenii condiționat patogeni pot avea un răspuns imun necorespunzător.

Se recomandă scoaterea flacoanelor cu vaccin de la frigider cu 2-3 ore înainte de începerea vaccinării pentru ca produsul să ajungă la temperatura de 15-25°C. Flaconul cu vaccin se agită bine înainte și pe tot parcursul utilizării pentru a asigura omogenizarea emulsiei.

Se vor folosi seringi și/sau ace de unică folosință.

##### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Personalul care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție compus din: eizme de cauciuc, halat, bonetă, mănuși.

Acest produs conține ulei mineral. În cazul unei injectări accidentale cu acest produs solicitați sfatul medicului și prezentați-i prospectul produsului chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Personalul operator cu sensibilitate cunoscută la unul din ingredientele produsului trebuie să evite contactul cu acesta.

#### **4.6. Reacții adverse**

Vaccinul PARAMIXOVACOL nu produce reacții generale postvaccinale. După administrare pot apărea reacții locale (sub forma unui nodul care reprezintă depozitul de vaccin) de intensitate redusă și tranzitorii.

#### **4.7. Utilizarea în perioada de ouat**

Vaccinul nu influențează performanțele productive.

#### **4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu sunt informații disponibile asupra siguranței și eficacității prin folosirea concomitentă a acestui vaccin cu alt produs biologic.

Se recomandă să nu se administreze alt vaccin cu mai puțin de 14 zile înainte sau după vaccinarea cu PARAMIXOVACOL.

#### **4.9. Cantități de administrat și calea de administrare**

Doza vaccinală este de 0,2 ml. Vaccinul se administrează subcutanat în treimea mijlocie a părții dorsale a gâtului.

#### **4.10. Supradoxarea**

Nu s-au semnalat cazuri de reacții adverse generale sau locale în caz de supradoxare. La doze duble nu apar semne clinice.

În testul pentru controlul inocuității sunt inoculate 2 doze/pasare. Fără ca acestea să producă mortalitate sau să determine apariția semnelor clinice de boală, atribuite inoculului.

#### **4.11. Timp de așteptare**

Pentru carne 0 zile.

### **5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE**



Vaccinul PARAMIXOVACOL este un produs medicinal veterinar imunologic inactivat, utilizat

## **5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE**

Vaccinul PARAMIXOVACOL este un produs medicinal veterinar imunologic inactivat, utilizat pentru imunizarea activă contra paramixovirozei porumbeilor).

Cod ATC: QI01EA01

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1. Lista excipientilor**

- adjuvant mineral .....	80%
- ulei mineral ușor	
- Montanide ISA 70	
- emulgator - Span 80 .....	5%
- inactivant – aldehidă formică p.a sol 37% .....	maxim 0,5%

### **6.2. Incompatibilități**

Vaccinul nu se amestecă cu alte produse medicinale în timpul administrării.

### **6.3. Perioada de valabilitate**

18 luni de la data preparării emulsiei.

Perioada de valabilitate după desigilare este de 6 ore.

### **6.4. Precauții speciale pentru depozitare**

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2–8°C).

A nu se congela.

A nu se utilizează după data de expirare înscrișă pe eticheta flaconului.

### **6.5. Natura și compoziția ambalajului primar**

Vaccinul este repartizat în flacoane sterile de sticlă sau material plastic conținând 10, 20, 50, 100, 200 de doze. Flacoanele sunt închise cu dopuri de cauciuc atoxic alimentar sterile și sigilate cu capse de aluminiu apoi sunt ambalate în cutii colective, fiind însoțite de *Prospectul* produsului (minim 5 exemplare).

### **6.6. Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor**

Pentru protecția mediului produsul rămas neutilizat sau deșeurile nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere ci în locuri special amenajate. Distrugerea deșeurilor se realizează prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat, autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente..

## **7. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE**

ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov.

E-mail: romvac @ romvac.ro

Telefon: 350 31 11; 350 31 07; 350 31 09; 491 54 59

Fax: 350 31 10; 352 75 84. Fax Livrări: 491 54 61

## **8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Autorizație de fabricație și comercializare: 070073/14.03.2007

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI**

11.08.1997

## **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Ianuarie 2008.



**11. INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE.**  
Nu este cazul.

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC ST.  
RMI  
Dr. Petru ȘTEFĂNESCU

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Chim. Constantin CHIURCIU



DIRECTOR  
PRODUSE BIOLOGICE  
Dr. Ion NICOLAE

ŞEF LABORATOR CONTROL  
Dr. Silvia PURCAREA

ŞEF LABORATOR PROducțIE  
Dr. Petru SEVCIUC

Dr. Silvia PURCAREA  
șef laborator



**Romvac  
Company S.A.**

## ***PROSPECT***

### **PARAMIXOVACOL** Vaccin inactivat uleios contra paramixovirozei porumbeilor

#### **1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE**

Romvac Company SA – Șoseaua Centurii, nr. 7, 077190, Voluntari, județul Ilfov, România.

#### **2. DENUMIREA PRODUSULUI – PARAMIXOVACOL –**

Vaccin inactivat, uleios contra paramixovirozei porumbeilor.

#### **3. COMPOZIȚIA PRODUSULUI**

Fiecare doză vaccinală conține:

- antigenul specific – suspensie de paramixovirus tip 1, tulpina PMV 1 - RO 96, izolată de la porumbei și cultivată pe ouă embrionate de găină cu titrul minim înainte de inactivare de $10^9$ DIF <sub>50</sub> /ml .....	15%
- adjuvant mineral multiplu (ulei mineral ușor, Montanide ISA 70).....	80%
- emulgator - Span 80 .....	5%
- inactivant – aldehidă formică p.a sol 37%.....	maxim 0,5%

#### **4. INDICAȚII**

Vaccinul PARAMIXOVACOL se folosește în profilaxia specifică a paramixovirozei la porumbei.

#### **5. CONTRAINDICAȚII**

Nu se vor vaccinea porumbeii afectați de boli nutrițional-metabolice, parazitare sau infecțioase, întrucât pot avea un răspuns imun necorespunzător.


Nu se vor vaccinea porumbeii tineri sub vîrstă de 6-8 săptămâni.

#### **6. REACȚII ADVERSE**

Vaccinul PARAMIXOVACOL nu produce reacții generale postvaccinale. După administrare pot apărea reacții locale (sub forma unui nodul care reprezintă depozitul de vaccin) de intensitate redusă și tranzitorii.

#### **7. SPECIȚINTĂ**

Porumbei.



## **8. DOZE, MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Doza vaccinală este de 0,2 ml. Vaccinul se administrează subcutanat în treimea mijlocie a părții dorsale a gâtului.

## **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Timpul optim de vaccinare depinde de situația epidemiologică a efectivelor, fiind evaluat sub directa coordonare a medicului veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară cu avizul DSVSA județene.

Vaccinarea cu PARAMIXOVACOL se va face după cel puțin o administrare pe cale oculo-conjunctivală de vaccin antipseudopestos aviar Avipestisota.

Cu cel puțin două săptămâni înainte de vaccinarea cu PARAMIXOVACOL se va face deparazitarea internă (cu Flagelstop sau Rombendazol) și externă (cu Romparatox). Se recomandă efectuarea de tratamente antistress cu Complex Polivitaminic Buvabil cu 2-3 zile înainte și 2-3 zile după vaccinare.

Porumbeii adulți se vaccinează cu cel puțin 14 zile înainte de concursuri, expoziții sau împerechere.

Se recomandă scoaterea flacoanelor cu vaccin de la frigider cu 2-3 ore înainte de începerea vaccinării pentru ca produsul să ajungă la temperatura de 15-25°C. Flaconul cu vaccin se agită bine înainte și pe tot parcursul utilizării pentru a asigura omogenizarea emulsiei.

Se vor folosi seringi și/sau ace de unică folosință.

Vaccinul nu se amestecă cu alte produse medicinale în timpul administrării.

## **10. TEMP DE AȘTEPTARE**

Pentru carne 0 zile.

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2-8°C), ferit de lumină.

A nu se congela.

Perioada de valabilitate după desigilare este de 6 ore.

A nu se utilizează după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului.

## **12. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Se vor respecta normele generale de conduită privind manipularea produselor biologice veterinare.

Acest produs conține ulei mineral. În cazul unei injectări accidentale cu acest produs solicități sfatul medicului și prezentați-i prospectul produsului chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Nu sunt informații disponibile asupra siguranței și eficacității prin folosirea concomitentă a acestui vaccin cu alt produs biologic.

La doze duble nu apar semne clinice.

## **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR**

Pentru protecția mediului, flacoanele cu produs rămas neutilizat, flacoanele goale sau alte deșeuri sunt tratate cu un dezinfecțant adecvat, neutralizate prin fierbere sau ardere și nu trebuie aruncate în ape reziduale sau la resturi menajere ci în locuri special amenajate.



**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA OARĂ PROSPECTUL**  
Ultima reînregistrare a produsului cu eliberarea Autorizației de comercializare și de fabricație a fost efectuată de către Comitetul pentru Produsele Medicinale Veterinare, în ședință din 22.12.2006.  
Ultima revizie a prospectului: Ianuarie 2008.

**15. ALTE INFORMAȚII**


Vaccinul PARAMIXOVACOL se prezintă sub formă de emulsie alb-lăptoasă care prin depozitare la 2-8°C se poate separa în două faze și care prin agitare se omogenizează ușor. Vaccinul se livrează în flacon de sticlă sau material plastic conținând 10, 20, 50, 100, 200 de doze.

Pentru orice informații referitoare la acest produs biologic veterinar vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.  
Informații suplimentare despre acest produs sunt disponibile pe site-ul [www.romvac.ro](http://www.romvac.ro).

**Producător:**

**ROMVAC COMPANY S.A.**  
Sos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov  
E-mail: [romvac @ romvac.ro](mailto:romvac@romvac.ro)  
Telefon: 350 31 11; 350 31 07;  
350 31 09; 491 54 59  
Fax: 350 31 10; 352 75 84  
Fax Livrări: 491 54 61

Rugăm a înscri și orice reclamație cu numărul de serie inseris pe eticheta flaconului.



DIRECTOR ȘTIINȚIFIC  
RMI  
  
Dr. Petru STIUBE

DIRECTOR  
PRODUSE BIOLOGICE  
  
Dr. Ion NICOLAE

ŞEF LABORATOR CONTROL  
  
Dr. Silvia DURCAREA

ŞEF LABORATOR PROducțIE  
  
Dr. Petru SEVCIUC

Dr. Silvia DURCAREA


# LABORATORUL VACCINURI INACTIVATE, OVOCUTURĂ, ANTIBACTERIENE ȘI REAGENTI BACTERIENI

## MODELE DE ETICHETE PARAMIXOVACOL

Eticheta pentru cutii



Eticheta primară (flacon)



Dr. Schwartz Gengelo  
95/ln