


B. PROSPECT

PASTAZOL F

- comprimate pentru porumbei -



1. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI PRODUCĂTOR

S.C. PASTEUR – FILIALA FILIPEȘTI S.R.L.

Str. Principală nr. 944, Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova, România

Tel.: 0244-386888; 0244-386699 Fax: 0244-386699

E-mail: pasteur.filipesti@pasteur.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PASTAZOL F, 8 mg/comprimat, comprimate pentru porumbei.

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

1 comprimat conține:

Fenbendazol 8 mg

Excipienți: Dioxid de siliciu coloidal, celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu, lauril sulfat de sodiu, stearat de magneziu, lactoză monohidrat, talc.

4. INDICAȚII

Tratamentul parazitozelor intestinale provocate de unele nematode (*Capillaria obsignata*, *Ascaridia columbae*) și de unele cestode (*Hymenolepis columbae*, *Raillietina columbae*).

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează porumbeilor destinați consumului uman sau cu vârsta mai mică de 2 luni.

Nu se administrează în caz de sensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

Fenbendazolul poate determina tulburări hematopoetice și necroze ale vilozităților intestinale.

Administrat în doza recomandată nu produce reacții alergice.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

- Porumbei voiajori



8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează oral, în doză de 1 comprimat/porumbel/zi (8 mg s.a./porumbel/zi).

Se deparazitează întregul efectiv de porumbei, în același timp. Comprimatul se introduce prin ciocul deschis, masând ușor gâtul porumbelului pentru a asigura deplasarea comprimatului de-a lungul esofagului.

Efectul acțiunii de deparazitare se verifică prin examen coproparazitologic, după un interval de 3 – 4 săptămâni după administrarea tratamentului.

Administrarea se face numai sub supravegherea medicului veterinar.

În caz de reinfestare cereți sfatul medicului veterinar privind necesitatea repetării și asupra frecvenței administrării produsului.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A se respecta doza recomandată.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură mai mică de 25°C, în ambalajul original, ferit de lumina directă și umiditate.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare: 2 ani.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Produsul nu se utilizează în perioada năpârlirii, ouatului și creșterea puilor (perioada de formare a penajului) deoarece determină uneori anormalități ale formării penelor, reducerea ouatului și a procentului de ecloziune.

Pentru evitarea dezvoltării rezistenței paraziților la tratamentul cu antihelmintice se vor evita:

- utilizarea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă pe o durată lungă de timp;
- subdozarea, prin subestimarea greutateii corporale sau în urma administrării greșite a medicamentului.

Dozarea incorectă poate favoriza dezvoltarea rezistenței la antihelmintice. În acest caz utilizați pentru tratament un alt antihelmintic din altă clasă farmacologică și cu un mod de acțiune diferit.

Persoanele cu sensibilitate cunoscută la fenbendazol sau la excipienții produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

Uneori pot apare unele reacții mai grave. Umflarea feței, a pleoapelor sunt semne grave care necesită asistență medicală. Prezentați prospectul medicului.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Pentru împiedicarea difuzării în mediu, odată cu fecalele, a substanței active din medicament, recomandăm ca pe perioada tratamentului păsările să fie ținute în volieră. Dejecțiile de la păsările tratate se vor colecta și depozita pe platforma de bălegar timp de 1 lună pentru inactivarea substanței active, după care pot fi utilizate pentru fertilizarea solului în agricultură.

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Fenbendazolul este un antihelmintic ce interferează cu metabolismul nematodelor gastro-intestinale și respiratorii, atât în forme adulte cât și imature. Administrat pe cale orală se absoarbe rapid și difuzează în toate organele și țesuturile producând liza endoparaziților din tubul digestiv și aparatul respirator.


Fenbendazolul, după administrarea pe cale orală, este absorbit rapid în fluxul sanguin și difuzat în toate organele, inclusiv în ficat, unde este metabolizat în derivații săi sulfoxid (fenbendazol sulfoxid) și sulfon.

Eliminarea fenbendazolului se face în principal prin fecale și în cantități mai reduse prin urină.

PREZENTARE:

Cutii din carton cu 10 blistere din PVC/ALU a câte 10 comprimate fiecare.


Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.



A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton x 10 blistere din PVC/ALU a câte 10 comprimate



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PASTAZOL F, 8 mg/comprimat, comprimate pentru porumbei.
Fenbendazol.

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 comprimat conține:

Fenbendazol 8 mg

Excipienți: dioxid de siliciu coloidal, celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu, lauril sulfat de sodiu, stearat de magneziu, lactoză monohidrat, talc.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Cutie cu 10 blistere a câte 10 comprimate.

5. SPECII ȚINTĂ

- Porumbei voiajori

6. INDICAȚII

Tratamentul parazitozelor intestinale provocate de unele nematode (*Capillaria obsignata*, *Ascaridia columbae*) și de unele cestode (*Hymenolepis columbae*, *Raillietina columbae*).

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.


Se administrează pe cale orală, în doză de 1 comprimat/porumbel/zi (8 mg s.a./porumbel/zi).

Se deparazitează întregul efectiv de porumbei, în același timp.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ



nu se utiliza după data marcată pe ambalaj. Citiți prospectul înainte de utilizare!

10. DATA EXPIRĂRII

EXP. (luna/an):

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C, în ambalajul original, protejat de lumina directă și umiditate.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”, DUPĂ CAZ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. PASTEUR – FILIALA FILIPEȘTI S.R.L.

Str. Principală nr. 944, Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova, România

Tel.: 0244-386888; 0244-386699 Fax: 0244-386699

E-mail: pasteur.filipesti@pasteur.ro

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

120007 / 11.01.2012

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot:



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

Blister din PVC/ALU a câte 10 comprimate

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PASTAZOL F, 8 mg/comprimat, comprimate pentru porumbei.
Fenbendazol.

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. PASTEUR – FILIALA FILIPEȘTI S.R.L.

3. DATA EXPIRĂRII

EXP. (luna/an):

4. NUMĂRUL SERIEI

Lot/serie:

5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

