



**Romvac
Company S.A.**

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI PESTIHOLVAC FORTE

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE este un produs imunologic veterinar inactivat, constituit din suspensie de virus al bolii de Newcastle, tulpina lentogenă LaSota, cu titrul minim înainte de inactivare de $10^{8,5}$ DIE₅₀/ml și suspensie în TFS (tampon fosfat salin), concentrată de 20 ori, de germenii Pasteurella multocida, tulpinile C.U (Clemson University – SUA), Ar (Arad), Mh (Mihăilești), Or (Oradea) cu titrul minim 5×10^9 UFC (unități formatoare de colonii)/ml. Suspensiile sunt adsorbite pe hidroxid de aluminiu.

2. COMPOZIȚIA PRODUSULUI

Fiecare doză conține:

- antigenele specifice:

- suspensie de virus Newcastle tulpina LaSota, cu titrul minim înainte de inactivare $10^{8,5}$ DIE ₅₀ /ml	15%
- suspensie în TFS (tampon fosfat salin), concentrată de 20 ori, de germenii Pasteurella multocida tulpina C.U (Clemson University – SUA) și trei tulpini izolate din România: Ar (Arad), Mh (Mihăilești), Or (Oradea) cu titrul minim 5×10^9 UFC (unități formatoare de colonii)/ml.....	5%
- adjuvant mineral multiplu	75%
ulei mineral ușor	
Montanide ISA 70	
gel de hidroxid de aluminiu	
- emulgator (Span 80)	5%
- inactivant – aldehidă formică p.a sol 37%.....	maxim 0,5%

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE se prezintă sub formă de emulsie alb-lăptoașă care prin depozitare la 2 – 8°C se poate separa în două faze și care prin agitare se omogenizează ușor.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1. Specii țintă

Găini, curci, fazani, bibilici.

4.2. Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE se folosește în imunoprofilaxia specifică a pseudopestei aviare (boala de Newcastle) și a holerei aviare (pasteureloza aviară) la speciile receptive (găini, curci, fazani, bibilici) din efectivele indemne, clinic sănătoase.

Pentru pseudopesta aviară imunitatea se instalează după 14 - 21 de zile de la prima vaccinare iar pentru holera aviară după 14 - 21 de zile de la vaccinarea de rapel.

Durata imunității este de 4-5 luni și depinde de starea de sănătate și condițiile de înțepere a speciei.



efectivelor.

Întreținerea stării de imunitate se face prin revaccinări periodice din 4 în 4 luni.

În vaccinarea antiholerică se obțin rezultate bune (60-70% creșterea rezistenței față de infecție) numai dacă există corespondență între structura antigenică a tulpinilor vaccinale și a celor din teren deoarece imunitatea incrucișată este slabă sau nulă.

4.3. Contraindicații

Vaccinul PESTIHLVAC FORTE nu se folosește în prevenția de necesitate a bolii de Newcastle sau holerei aviare.

Nu se va efectua vaccinarea în focare evolutive de boli infecțioase.

Nu se vor vaccina păsările tarate, cu stare proastă de întreținere sau afectate de boli nutrițional-metabolice și/sau parazitare deoarece răspunsul imun poate fi necorespunzător.

Nu se vor vaccina cu PESTIHLVAC FORTE puii de curcă la o vârstă mai mică de 3 săptămâni și cei de găină sub vârstă de 8 săptămâni.

4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu sunt.

4.5. Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Timpul optim de vaccinare depinde de situația epizootologică a efectivelor și a zonei unde sunt crescute păsările, fiind evaluat sub directa coordonare a medicului veterinar care asigură supravegherea sanitatării veterinară cu avizul DSVSA județene.

Vaccinările se vor efectua conform prevederilor din *Programul acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor* elaborat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Se recomandă scoaterea flacoanelor cu vaccin de la frigider cu 2-3 ore înainte de începerea vaccinării pentru ca produsul să ajungă la temperatura de 15-25°C (asigurarea fluidizării).

Flaconul cu vaccin se agită bine înainte și pe tot parcursul utilizării pentru a asigura omogenizarea emulsiei.

Se vor folosi seringi și/sau ace de unica folosință.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Personalul care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie să poarte echipament de protecție compus din: eizme de cauciuc, halat, bonetă, mănuși.

Acest produs conține ulei mineral. În cazul unei injectări accidentale cu acest produs solicitați sfatul medicului și prezentați-i prospectul produsului chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Personalul operator cu sensibilitate cunoscută la unul din ingredientele produsului trebuie să evite contactul cu acesta.

4.6. Reacții adverse

Vaccinul PESTIHLVAC FORTE nu produce reacții generale postvaccinale.

După administrare pot apărea reacții locale (sub forma unui nodul care reprezintă depozitul de vaccin) de intensitate redusă și tranzitorii.


4.7. Utilizarea în perioada de ouat

Vaccinul nu influențează performanțele productive.

4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu sunt informații disponibile asupra siguranței și eficacității prin folosirea concomitantă a acestui vaccin cu alt produs biologic.

Se recomandă să nu se administreze alt vaccin cu mai puțin de 14 zile înainte sau după vaccinarea cu PESTIHLVAC FORTE.



4.9. Cantități de administrat și calea de administrare

Doza vaccinală este de 0,3 ml indiferent de vârstă păsărilor și specia pentru care este recomandat vaccinul.

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE se administrează subcutanat (în treimea mijlocie a gâtului, pe partea dorsală) sau intramuscular (în mușchii coapsei sau pieptului). Păsările care urmează să fie sacrificiate pentru carne în următoarele 30 de zile se vor vaccina numai subcutanat în regiunea cefei.

4.10. Supradoxarea

Nu s-au semnalat cazuri de reacții adverse generale sau locale în caz de supradoxare.

La doze duble nu apar semne clinice.

În testul pentru controlul inocuității sunt inoculate 2 doze/pasăre, fără ca acestea să producă mortalitate sau să determine apariția semnelor clinice de boală, atribuite inoculului.

4.11. Timp de așteptare

Pentru carne 0 zile; pentru ouă 0 zile.

5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE este un produs medicinal veterinar imunologic inactivat, utilizat pentru imunizarea activă contra bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) și pasteurelozei aviare la speciile receptive.

Cod ATC: QI01AL04

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1. Lista excipientilor

- adjuvant mineral multiplu	75%
(ulei mineral ușor	
Montanide ISA 70	
gel de hidroxid de aluminiu)	
- emulgator (Span 80)	5%
- inactivant – aldehidă formică p.a sol 37%.....	maxim 0,5%

6.2. Incompatibilități

Vaccinul nu se amestecă cu alte produse medicinale în timpul administrării.

6.3. Perioada de valabilitate

18 luni de la data preparării emulsiei.

Perioada de valabilitate după desigilare este de 6 ore.

6.4. Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare la temperaturi cuprinse între +2 și +8°C.

A nu se congela.


A nu se utilizează după data de expirare inscrisă pe eticheta flaconului.

6.5. Natura și compoziția ambalajului primar

Vaccinul este repartizat în flacoane sterile de sticlă sau material plastic cu 50, 100, 200, 500 de doze. Flacoanele sunt închise cu dopuri de cauciuc atoxic alimentar sterile și sigilate cu capse de aluminiu apoi sunt ambalate în cutii colective, fiind însoțite de *Prospectul* produsului (minim 5 exemplare).

6.6. Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor

Pentru protecția mediului produsul rămas neutilizat sau deșeurile nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere ci în locuri special amenajate. Distrugerea deșeurilor se realizează prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat, autorizat pentru utilizare de către autoritățile competente.



7. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICATIE

ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari - București, Jud. Ilfov.

E-mail: romvac @ romvac.ro

Telefon: 350 31 11; 350 31 07; 350 31 09; 491 54 59

Fax: 350 31 10; 352 75 84. Fax Livrări: 491 54 61

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Autorizație de fabricație și comercializare: 050678-25.10.2005

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI

31.01.2001

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ianuarie 2008.

11. INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE.

Nu este cazul.



DIRECTOR ȘTIINȚIFIC SI
RMI

Dr. Petru ȘTIUBE

DIRECTOR
PRODUSE BIOLOGICE

Dr. Ion NICOLAE

SEF LABORATOR CONTROL

Br. Silvia PURCAREA

SEF LABORATOR PROducțIE

Dr. Petru SEVCIUC

Dr. Gheorghe
George
Gheorghe
Gheorghe



**Romvac
Company S.A.**

PROSPECT

PESTIHOL.VAC FORTE

Vaccin mixt, inactivat, cu adjuvant uleios contra pseudopestei și holerei aviare.

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE

Romvac Company SA – Șoseaua Centurii, nr. 7, 077190, Voluntari, județul Ilfov, România.

2. DENUMIREA PRODUSULUI

– PESTIHOLVAC FORTE –

Vaccin mixt, inactivat, cu adjuvant uleios, contra pseudopestei și holerei aviare.

3. COMPOZIȚIA PRODUSULUI

Fiecare doză vaccinală conține:

- antigenele specifice:

- suspensie de virus Newcastle tulipina LaSota, cu titrul minim înainte de inactivare $10^{8,5}$ DIF_{50/ml} 15%
- suspensie în TFS (tampon fosfat salin), concentrată de 20 ori, de germenii Pasteurella multocida tulipina C.U (Clemson University – SUA) și trei tulpini izolate din România: Ar (Arad), Mh (Mihăilești), Or (Oradea) cu titrul minim 5×10^9 UFC (unități formatoare de colonii)/ml 5%

- adjuvant mineral multiplu 75%

- ulei mineral ușor

- Montanide ISA 70

- gel de hidroxid de aluminiu

- emulgator (Span 80) 5%

- inactivant – aldehidă formică p.a sol 37% maxim 0,5%

4. INDICAȚII

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE se folosește în imunoprofilaxia specifică a pseudopestei aviare (boaala de Newcastle) și a holerei aviare (pasteureloza aviara) la speciile receptive (găini, curci, fazani, bibilici) din efectivele indemne, clinic sănătoase.

Pentru pseudopesta aviară imunitatea se instalează după 15 - 21 de zile de la prima vaccinare iar pentru holera aviară după 14 - 21 de zile de la vaccinarea de rapel.

Durata imunității este de 4-5 luni și depinde de starea de sănătate și condițiile de întreținere a efectivelor.

Întreținerea stării de imunitate se face prin revaccinări periodice din 4 în 4 luni.



În vaccinarea antiholerică se obțin rezultate bune (60-70% creșterea rezistenței față de infecție) numai dacă există corespondență între structura antigenică a tulpinilor vaccinale și a celor din teren deoarece imunitatea încrucișată este slabă sau nulă.

5. CONTRAINDICAȚII

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE nu se folosește în prevenția dc necesitate a bolii de Newcastle sau holerei aviare.

Nu se va efectua vaccinarea în locare evolutive de boli infecțioase.

Nu se vor vaccina păsările tarate sau afectate de boli nutrițional- metabolice și/sau parazitare deoarece răspunsul imun poate fi necorespunzător.

Nu se vor vaccina cu PESTIHOLVAC FORTE puții de curcă la o vîrstă mai mică de 3 săptămâni și cei de găină sub vîrstă de 8 săptămâni.

6. REACȚII ADVERSE

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE nu produce reacții generale postvaccinale.

După administrare pot apărea reacții locale (sub forma unui nodul care reprezintă depozitul de vaccin) de intensitate redusă și tranzitorii.

7. SPECII ȚINTĂ

Găini, curci, fazani, bibilici.

8. DOZE, MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Doza vaccinală este de 0,3 ml indiferent de vîrstă păsărilor și specia pentru care este recomandat vaccinul.

Vaccinul PESTIHOLVAC FORTE se administrează subcutanat (în treimea mijlocie a gâtului, pe partea dorsală) sau intramuscular (în mușchii coapselor sau pieptului). Păsările care urmărează să fie sacrificiate pentru carne în următoarele 30 de zile se vor vaccina numai subcutanat.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Timpul optim de vaccinare depinde de situația epizootologică a efectivelor și a zonei unde sunt crescute păsările, fiind evaluat sub directă coordonare a medicului veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară cu avizul DSVSA județene.

Vaccinările se vor efectua conform prevederilor din *Programul acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor* elaborat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Se recomandă scoaterea flacoanelor cu vaccin de la frigider cu 2-3 ore înainte de începerea vaccinării pentru ca produsul să ajungă la temperatura de 15-25°C (asigurarea fluidizării).

Flaconul cu vaccin se agită bine înainte și pe tot parcursul utilizării pentru a asigura omogenizarea emulsiei.

Se vor folosi seringi și/sau acc de unica folosință.

10. TIMP DE AȘTEPTARE


Pentru carne 0 zile; pentru ouă 0 zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2-8°C).

A nu se congela.



Perioada de valabilitate după desigilare este de 6 ore.
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se vor respecta normele generale de conduită privind manipularea produselor biologice veterinare.

Acest produs conține ulci mineral. În cazul unei injectări accidentale cu acest produs solicitați sfatul medicului și prezențați-i prospectul produsului chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Nu sunt informații disponibile asupra siguranței și eficacității prin folosirea concomitentă a acestui vaccin cu alt produs biologic.

Se recomandă să nu se administreze alt vaccin cu mai puțin de 14 zile înainte sau după vaccinarea cu PESTIHLVAC FORTE.

Vaccinul nu se amestecă în același recipient cu alte produse medicinale în timpul administrării. La doze duble nu apar semne clinice.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Pentru protecția mediului, flacoanele cu produs rămas neutilizat, flacoanele goale sau alte deșeuri sunt tratate cu un dezinfecțant adecvat, neutralizate prin fierbere sau ardere și nu trebuie aruncate în ape reziduale sau la resturi menajere ci în locuri special amenajate.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA OARĂ PROSPECTUL

Ultima reînregistrare a produsului cu eliberarea Autorizației de comercializare și de fabricație a fost efectuată de către Comitetul pentru Produsele Medicinale Veterinare, în ședință din 1.09.2005.

Ultima revizie a prospectului: Ianuarie 2008.

15. ALTE INFORMAȚII

Vaccinul PESTIHLVAC FORTE se prezintă sub formă de emulsie alb-lăptoasă care prin depozitare la 2–8°C se poate separa în două faze și care prin agitare se omogenizează ușor.

Vaccinul se livrează în flacoane de sticlă sau material plastic conținând 50, 100, 200, 500 de doze.

Pentru orice informații referitoare la acest produs biologic veterinar vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Informații suplimentare despre acest produs sunt disponibile pe site-ul www.romvac.ro.

Producător:

ROMVAC COMPANY S.A.

Sos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov


E-mail: romvac @ romvac.ro

Telefon: 350 31 11; 350 31 07;


350 31 09; 491 54 59

Fax: 350 31 10; 352 75 84

Fax Livrări: 491 54 61



Rugăm a înscri și orice reclamație cu numărul de serie inseris pe eticheta flaconului.



DIRECTOR ȘTIINȚIFIC
RMI
P. Știube
Dr. Petru ȘTIUBE

DIRECTOR
PRODUSE BIOLOGICE
I. Nicolae
Dr. Ion NICOLAE

ŞEF LABORATOR CONTROL
S. Purcărea
Dr. Silvia PURCAREA

ŞEF LABORATOR PROducțIE
P. Sevciuc
Dr. Petru SEVCIUC

*A. Bălănești - George
G. G. Lăpuș*


LABORATORUL VACCINURI INACTIVATE, OVOCUTURĂ, ANTIBACTERIENE ȘI REAGENȚI BACTERIENI

MODELE DE ETICHETE PESTIHOLVAC FORTE

Eticheta pentru cutii



Eticheta primară (flacon)



G. B. Gheorghiu