

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PESTIVAC M

VACCIN ANTIPESTOS PENTRU MISTREȚI

PREZENTARE

Vaccin viu atenuat în blister înglobat în matrice (momeală) de amestec de făină de porumb și grâu cu arome atractive pentru animalele țintă. Momeala se introduce în folie de polietilenă termocontractilă și reprezintă o singură doză.

COMPOZIȚIE

Fiecare momeală conține un blister cu o singură doză 1,6 – 1,7 ml:

- virus atenuat pestă porcină tulpina IP-77 /10⁶* DICEF₅₀/doză
- stabilizator de virus
- o matrice solidă făină de porumb/grâu cu arome

* la finalul valabilității 10^{4.5} DICEP în timpul administrării la mistreți

INDICAȚII

Se utilizează în imunoprofilaxia pestei porcine clasice la mistreți și porci domestici crescuți în semisălbăticie.

MOD DE ADMINISTRARE

O momeală reprezintă o doză de vaccin.

Campaniile de vaccinare sunt primăvara (martie-aprilie), vara (iulie-august) și toamna (noiembrie-decembrie).

Administrarea vaccinului se face ținând cont de locurile unde sunt hrăniți suplimentar în mod obișnuit mistreții din zona respectivă.


Locul de administrare este recomandat să fie de /200m² cu 20-40 de momeli pe spot (loc) de administrare. Serviciile veterinare locale și ocoalele silvice în colaborare cu vânătorii vor stabili locurile de administrare ale vaccinului.

Momeala cu blisterul vaccinal se pune într-o cavitate mică (groapa) împreună cu boabe de porumb și grâu și se acoperă cu pământ.

Boabe de porumb și grâu se împrăștie și la suprafață în restul spotului cu momeli.

Pentru accesul porceilor la momelile vaccinale se montează 1-2 țarcuri unde se pun momeli, la care au acces numai porceii.

După administrarea timp de cel puțin 4 zile nu se va permite vânătoarea.



Dacă luna în considerare fazele lunii se recomandă cu administrarea vaccinului să se facă când este lună pe jumătate (jumătate de lună).

RAPELUL

Se face prin administrarea de alte momeli cu vaccin la 28 zile după prima administrare.

REAȚII POSVACCINALE

Vaccinul nu produce reacții adverse consecutiv administrării.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

AMBALAJ

Pungă polietilenă cu 10, 20, 40 momeli.

CONSERVARE - TRANSPORT

Produsul se conservă congelat (- 10-20°C) și se transportă în genți izoterme până la administrare.

Produsul nu se va decongela și va fi ferit de soare pe toată perioada de transport și administrare.

VALABILITATE

Păstrat la congelator (- 10-20°C) vaccinul are o valabilitate de 12 luni.

PRODUCĂTOR



Societatea Națională "Institutul Pasteur" S.A
Calea Giulești nr. 333, sector VI, București, cod 060269
Tel.(01)220.69.20 Fax (01)220.69.15

Rugăm însoțiți orice reclamație cu numărul seriei înscris pe etichetă

Prof. dr. I. Ionescu
de laborator
1