

*Anexa ur. 1*

## **ANEXA I**

### **REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

## **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

PET – SPOT FORTE S soluție spot-on pentru câini de talie mică.

## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

O pipetă cu 1,5 ml soluție conține:

### **Substanțe active:**

Fipronil.....67,5 mg

Piriproxifen.....67,5 mg

### **Excipienti:**

Butilhidroxianisol.....0,3 mg

Butilhidroxitoluen..... 0,15 mg

Alcool benzilic.....60 mg

Pentru lista completă a excipientilor vezi secțiunea 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție spon-on.

Se prezintă sub formă de soluție limpede, de culoare galben – galben roșcat.

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă:**

Câini de talie mică (2 – 10 kg).

### **4.2 Indicații de utilizare:**

Produsul este indicat la câini în tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) și păduchi (*Trichodectes canis*, *Linognatus setosus*).

Produsul poate fi utilizat în cadrul tratamentului contra dermatitelor alergice cauzate de purici.

### **4.3 Contraindicații:**

Nu se administrează la câini mai mici de 8 săptămâni sau cu greutatea sub 2 kg.

Nu se administrează animalelor bolnave sau în convalescență.

Nu se administrează altor animale (la iepuri de exemplu poate cauza moartea).

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la excipienti.

### **4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:**

Se va respecta aplicarea pipetei corespunzătoare greutății câinelui:



Pipetele pentru câini nu se vor aplica la pisici (determină supradozare).

Se va evita contactul produsului cu ochii animalului.

#### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare:**

##### **Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Produsul se va administra într-o zonă în care animalul nu se poate linge și de asemenea nu trebuie să existe posibilitatea ca animalele să se lingă unul pe celălalt.

După efectuarea tratamentului, animalul nu se va îmbăia sau lăsa să întră în același timp de 48 de ore, pentru a nu scurta durata eficacității produsului.

Pentru efecte optime și mai ales în cazul infestărilor masive se recomandă deparazitarea adăpostului, culcușului și a zonelor de odihnă cu insecticide destinate acestui scop (preferabil să se efectueze înaintea aplicării tratamentului).

Pentru controlul optim al infestării se vor trata toți câinii prezenti în adăpost.

##### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:**

Produs iritant pentru ochi și piele. A se evita contactul cu ochii și pielea.

În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu multă apă. Dacă iritația persistă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

A se spăla mâinile după utilizarea produsului.

Nu se fumează și nu se consumă alimente sau băuturi în timpul aplicării tratamentului.

Se va evita contactul cu animalul tratat (atât al copiilor cât și al adulților) până la uscarea pielii de la locul de aplicare.

Persoanele cunoscute cu hipersensibilitate la substanțele active vor evita contactul cu produsul.

#### **4.6 Reacții adverse:**

Ingerarea produsului (dacă animalul se linge după tratament) poate produce hipersalivare ușoară.

Rar pot apărea reacții cutanate pasagere la locul aplicării soluției sau generale (decolorarea pielii, prurit sau alopecia).

Rar se pot produce reacții neurologice reversibile sau vomă.

#### **4.7 Utilizarea în cazul gestației sau lactației:**

Produsul se poate utiliza în perioada de gestație sau lactație în baza evaluării raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar.



#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:**

Nu se cunosc.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare:**


Doza este de o pipetă cu 1,5 ml produs (67,5 mg fipronil/67,5 mg piriproxifen) pentru un animal cu greutatea de 2 – 10 kg.

Calea de administrare: direct pe piele, prin aplicarea locală a soluției spot-on din pipeta corespunzătoare greutății câinelui.

Se scoate pipeta din ambalaj.

Se ține pipeta cu vârful în sus și se rupe capătul pre-decupat.

În zona omoplașilor animalului se îndepărtează blana cu mâna până se vede pielea. Pipeta se golește prin apăsări repetitive, direct pe piele, pe o distanță de 2 – 4 cm, ținând tubul perpendicular pe zona respectivă.



Produsul se va răspândi pe toată suprafața corpului în 24 – 48 de ore.

Animalele nu trebuie îmbăiate timp de 48 de ore după administrarea produsului PET – SPOT FORTE S deoarece poate afecta eficacitatea produsului.

Tratamentul se poate repeta la un interval de minim 4 săptămâni.

#### **4.10 Supradozare:**

Nu se va depăși doza recomandată.

#### **4.11 Timp de așteptare:**

Nu este cazul.


### **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

Grupa farmacoterapeutică: alte ectoparaziticide pentru uz topic, fipronil, combinații.

Cod veterinar ATC: QP53AX65.

#### **5.1 Proprietăți farmacodinamice:**

Cele două substanțe active au roluri bine definite în acțiunea insecticidă/acaricidă și ovocidă a produsului.



Fipronil este un insecticid/acaricid din clasa fenil-pirazolului. Acționează prin interacțiunea cu canalele de ioni de clor cu implicare în neurotransmițatorul GABA (acid gama aminobutiric), blocând transferul pre și post sinaptic al ionilor de clor, dincolo de membrana celulară. Rezultă o activitate necontrolată a sistemului nervos și moartea insectelor/acarienilor.

Fipronil acționează asupra insectelor/acarienilor aflate în toate stadiile de dezvoltare.

Piriproxifenu nu omoară insectele adulte, dar acțiunea sa este completată de prezența insecticidului fipronil.

Piriproxifenu influențează procesul de creștere a insectelor, mimând hormonul juvenil.

Contactul cu ouăle depuse de femelele adulte împiedică eclozarea lor, iar larvele prezente să nu se mai transforme în purici adulți. Se întrerupe astfel ciclul evolutiv, ceea ce duce în final la scăderea semnificativă a numărului insectelor/acarienilor.

## **5.2. Particularități farmacocinetice:**

Excipientii produsului determină ca, după aplicare, substanțele active să se absoarbă în 24-48 de ore, prin intermediul stratului seboreic de pe piele. Acestea se colectează în glandele sebacee, de unde se eliberează treptat pe suprafața firelor de păr.

Fipronil nu se absoarbe sistemic.

Acțiunea prelungită a fipronilului se datorează și faptului că produsul rezultat în urma metabolizării (de tip sulfonă) prezintă, de asemenea, proprietăți insecticide/acaricide.

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipientilor:**

Alcool benzilic

Dietilenglicol monoetileter

Propilenglicol

Isopropil miristat

Polisorbat 80

Povidonă K30

Butilhidroxianisol


Butilhidroxitoluen

### **6.2 Incompatibilități majore:**

Nu se cunosc.

### **6.3 Perioada de valabilitate:**

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.



#### **6.4 Precauții speciale de depozitare:**

- A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.
- A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.
- A se feri de îngheț.
- A se proteja de lumină directă.
- A se păstra în ambalajul original.

#### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:**

Pipete unidoză din polietilenă de joasă densitate (LDPE) multistrat acoperite cu EVOH (cu barieră protectoare pentru oxigen și solvenți), care conțin 1,5 ml produs, închise prin sigilare termică și prevăzute cu capac din același material ca și pipeta (LDPE multistrat acoperit cu strat de EVOH).

#### ***Ambalaj secundar:***

1. Cutii din carton prevăzute cu suport pentru pipete care conțin 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24, 25 pipete x 1,5 ml.
2. Cutii din PVC transparente, prevăzute cu separatoare și capac din PVC, care conțin 24 pipete x 1,5 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

#### **6.6 Precautii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deseurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Nu se vor contamina lacurile, cursurile de apă sau canalele cu acest produs sau cu pipetele goale. Câinilor nu trebuie să li se permită să înnoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Fipronilul poate afecta organisme acvatice.

### **7. DETINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

#### **PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A**

Str. Principala, nr.944,  
Filipești de Padure, jud. Prahova,  
Romania  
Tel: +4 021 220 69 20,  
Fax: +4 021 220 69 15  
E-mail: [office@pasteur.ro](mailto:office@pasteur.ro)



**8. NUMARUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE**

200101

**9. DATA PRIMEI AUTORIZARI / REINNOIRII AUTORIZATIEI**


06.08.2015/23.07.2020

**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Ianuarie 2022

**INTERDICTII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI / SAU UTILIZARE**

Nu e cazul.





### **ANEXA III**

#### **ETICHETARE ȘI PROSPECT**

##### **A. ETICHETARE**

### **INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutii din carton cu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24, 25 pipete a câte 1,5 ml

Cutii din PVC cu 24 pipete a câte 1,5 ml

### **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

PET – SPOT FORTE S soluție spot-on pentru câini de talie mică.

Fipronil, piriproxifen.

### **2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

O pipetă cu 1,5 ml soluție conține:

#### **Substanțe active:**

Fipronil.....67,5 mg

Piriproxifen.....67,5 mg

#### **Excipienti:**

Butilhidroxianisol.....0,3 mg

Butilhidroxitoluen.....0,15 mg

Alcool benzilic.....60 mg

### **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție spot-on.

### **4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Cutii din carton cu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24, 25 pipete a câte 1,5 ml.

Cutii din PVC cu 24 pipete a câte 1,5 ml.

### **5. SPECII ȚINTĂ**

Câini de talie mică (2 – 10 kg).



## **6. INDICAȚII**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) și păduchi (*Trichodectes canis*, *Linognathus setosus*).

Produsul poate fi utilizat în cadrul tratamentului contra dermatitelor alergice cauzate de purici.

## **7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Citii prospectul înainte de utilizare.

## **8. TEMP DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

## **9. ATENȚIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ**

Citii prospectul înainte de utilizare.

## **10. DATA EXPIRĂRII**

EXP (luna/an):

## **11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de îngheț.

A se proteja de lumină directă.

## **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Materialele neutilizate se vor elibera conform cerințelor locale.

Eliminarea: citii prospectul produsului.



**13. MENȚIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR“ ȘI CONDIȚII SAU  
RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

Numai pentru uz veterinar.

**14. MENȚIUNEA “A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR“**

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A**


Str. Principala, nr.944,  
Filipești de Padure, jud. Prahova,  
Romania  
Tel: +4 021 220 69 20,  
Fax: +4 021 220 69 15  
E-mail: [office@pasteur.ro](mailto:office@pasteur.ro)

**16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

200101

**17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

Lot:





**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

Pipete din polietilenă de joasă densitate (LDPE) multistrat acoperite cu EVOH 1,5 ml soluție.

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**PET – SPOT FORTE S** soluție spot-on pentru câini de talie mică.

Fipronil, piriproxifen.

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚE ACTIVE**

O pipetă cu 1,5 ml soluție conține:

Fipronil ..... 67,5 mg

Piriproxifen ..... 67,5 mg

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

1,5 ml.

**4. CALE DE ADMINISTRARE**

Aplicare direct pe piele.

**5. TEMPORIZARE**

Nu este cazul.

**6. NUMĂRUL SERIEI**

Lot:

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP. (lună/an):

**8. MENȚIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.



**B. PROSPECT**  
**PET – SPOT FORTE S**

– soluție spot-on pentru câini de talie mică –

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIIOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

**PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A**

Str. Principala, nr.944,  
Filipești de Padure, jud. Prahova,  
Romania  
Tel: +4 021 220 69 20,  
Fax: +4 021 220 69 15  
E-mail: [office@pasteur.ro](mailto:office@pasteur.ro)

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

PET – SPOT FORTE S soluție spot-on pentru câini de talie mică.  
Fipronil, piriproxifen

**3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE**

O pipetă de 1,5 ml conține:

**Substanțe active:**

Fipronil.....67,5 mg  
Piriproxifen.....67,5 mg

**Excipienti:**

Butilhidroxianisol.....0,3 mg  
Butilhidroxitoluen..... 0,15 mg  
Alcool benzilic.....60 mg

**4. INDICAȚII**

Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*), căpușe (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) și păduchi (*Trichodectes canis*, *Linognathus setosus*).

Produsul poate fi utilizat în cadrul tratamentului contra dermatitelor alergice cauzate de purici.



## **5. CONTRAINDIKAȚII**

- Nu se administreză la câini mai mici de 8 săptămâni sau cu greutatea sub 2 kg.
- Nu se administreză animalelor bolnave sau în convalescență.
- Nu se administreză altor animale (la iepuri de exemplu poate cauza moartea).
- Nu se administreză în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la excipienti.

## **6. REACȚII ADVERSE**

Ingerarea produsului (daca animalul se linge după tratament) poate produce hipersalivare ușoară.

Rar pot apărea reacții cutanate pasagere la locul aplicării soluției sau generale (decolorarea pielii, prurit sau alopecia).

Rar se pot produce reacții neurologice reversibile sau vomă.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medical veterinar.

## **7. SPECII ȚINTĂ**

Câini de talie mică (2 – 10 kg).

## **8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂILE ȘI MODUL DE ADMINISTRARE**



Doza este de o pipetă cu 1,5 ml produs (67,5 mg fipronil/67,5 mg piriproxifen) pentru un animal cu greutatea de 2 – 10 kg.

Calea de administrare: direct pe piele, prin aplicarea locală a soluției spot-on din pipeta corespunzătoare greutății câinelui.

Se scoate pipeta din ambalaj.

Se ține pipeta cu vârful în sus și se rupe capătul pre-decupat.

În zona omoplașilor animalului se îndepărtează blana cu mâna până se vede pielea. Pipeta se golește prin apăsări repetitive, direct pe piele, pe o distanță de 2 – 4 cm, ținând tubul perpendicular pe zona respectivă.



Produsul se va răspândi pe toată suprafața corpului în 24 – 48 de ore.

Animalele nu trebuie îmbăiate timp de 48 de ore după administrarea produsului PET – SPOT FORTE S deoarece poate afecta eficacitatea produsului.

Tratamentul se poate repeta la un interval de minim 4 săptămâni.



## **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Produsul trebuie aplicat în zone unde câinele nu poate ajunge, astfel încât să nu poată linge locul aplicării.

Pentru a obține cele mai bune rezultate asigurați-vă că aplicați produsul direct pe piele și nu pe blană.

## **10. TEMP DE ASTEPTARE**

Nu este cazul.

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

A se feri de îngheț.

A se proteja de lumină directă.

A se păstra în ambalajul original.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă.

## **12. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

### **Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:**

Se va respecta aplicarea pipetei corespunzătoare greutății câinelui.

Pipetele pentru câini nu se vor aplica la pisici (determină supradozare).

Se va evita contactul produsului cu ochii animalului.

### **Precăuții speciale pentru utilizare:**

### **Precăuții speciale pentru utilizare la animale:**

Produsul se va administra într-o zonă în care animalul nu se poate linge și de asemenea nu trebuie să existe posibilitatea ca animalele să se lingă unul pe celălalt.

După efectuarea tratamentului, animalul nu se va îmbăia sau lăsa să înnoate timp de 48 de ore, pentru a nu scurta durata eficacității produsului.

Pentru efecte optime și mai ales în cazul infestărilor masive se recomandă deparazitarea adăpostului, culcușului și a zonelor de odihnă cu insecticide destinate acestui scop (preferabil să se efectueze înaintea aplicării tratamentului).

Pentru controlul optim al infestării se vor trata toți câinii prezenți în adăpost.

### **Precăuții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:**



Produs iritant pentru ochi și piele. A se evita contactul cu ochii și pielea.

În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu multă apă. Dacă iritația persistă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

A se spăla mâinile după utilizarea produsului.

Nu se fumează și nu se consumă alimente sau băuturi în timpul aplicării tratamentului.

Se va evita contactul cu animalul tratat (atât al copiilor cât și al adulților) până la uscarea pielii de la locul de aplicare.

Persoanele cunoscute cu hipersensibilitate la substanțele active vor evita contactul cu produsul.

#### **Utilizarea în cazul gestației sau lactației:**

Produsul se poate utiliza în perioada de gestație sau lactație în baza evaluării raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar.

#### **Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:**

Nu se cunosc.

#### **Supradozare:**

Nu se va depăși doza recomandată.

#### **Incompatibilități:**

Nu se cunosc.

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DESEURILOR, DUPĂ CAZ**

Nu se vor contamina lacurile, cursurile de apă sau canalele cu acest produs sau cu pipetele goale. Câinilor nu trebuie să li se permită să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile după aplicare. Fipronilul poate afecta organisme acvatice.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau împreună cu resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

### **14. DATA CAND A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

Ianuarie 2022



## **15. ALTE INFORMAȚII**

### **Dimensiunea ambalajelor:**

Pipete unidoză din polietilenă de joasă densitate (LDPE) multistrat acoperite cu EVOH (cu barieră protectoare pentru oxigen și solventi), care conțin 1,5 ml produs, închise prin sigilare termică și prevăzute cu capac din același material ca și pipeta (LDPE multistrat acoperit cu strat de EVOH).

### **Ambalaj secundar:**

Cutii din carton prevăzute cu suport pentru pipete care conțin 1, 3, 5, 10, 15, 20, 24, 25 pipete x 1,5 ml.

Cutii din PVC transparente, prevăzute cu separatoare și capac din PVC, care conțin 24 pipete x 1,5 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

