


[Versiunea 9,10/2021] corr. 11/2022



ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PolyVar Yellow 275 mg benzi pentru stupul de albine

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare bandă pentru stupul de albine conține:

Substanță activă:

Flumetrin 275 mg

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Dibutil adipat
Propilen glicol dicaprilocat
Ulei de soia epoxidat
Acid stearic
Policlorură de vinil
Dioxid de titan (E 171)
Oxid galben de fier (E172)

Benzi galbene, din material plastic cu 15 găuri.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Albine melifere (*Apis mellifera*).

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Pentru tratamentul varoozei la albine melifere cauzată de acarienii *Varroa destructor*.

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de rezistență cunoscută împotriva piretroidelor așa cum este descris în secțiunea 3.4, Atenționări speciale.

3.4 Atenționări speciale

Trebuie luată în considerare posibilitatea ca alte colonii situate pe aceeași stupină să poată fi o sursă de reinfestare cu *Varroa destructor*, iar acestea trebuie tratate simultan.

Utilizarea inutilă a antiparazitelor sau utilizarea care nu respectă instrucțiunile din Rezumatul caracteristicilor produsului poate accentua presiunea de selecție a rezistenței și poate duce la reducerea eficacității. Decizia de a utiliza produsul medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe confirmarea speciei și a încărcăturii de paraziți sau a riscului de infestare pe baza caracteristicilor sale epidemiologice, pentru fiecare stup de albine.



Produsul medicinal veterinar trebuie să fie utilizat ca parte a unui program integrat de combatere a *Varroa*.

Rezistența la piretroide a fost raportată la *Varroa destructor* la albinele melifere. Conform datelor publicate în literatură (2024), rezistența la flumetrin a *Varroa destructor* în Turcia a variat de la 51% la 94%.

În plus, rezistența la flumetrin a devenit larg răspândită la nivel global, evidențiind mutațiile predominante în țările mediteraneene.

Ca o metodă eficientă pentru a reduce riscul de selecție a rezistenței, produsele care conțin flumetrin – ca și alte acaricide – nu trebuie utilizate în ani consecutivi. În schimb, o rotație strictă cu produse care conțin substanțe active din alte clase chimice, ar trebui efectuată. În funcție de situația de rezistență regională o pauză de tratament mai mult de un an poate fi necesară. Deoarece flumetrinul și tau-fluvalinatul fac parte din aceeași clasă, nu sunt potrivite pentru a se roti între ele. Utilizarea inadecvată a produsului medicinal veterinar ar putea duce la un risc crescut de dezvoltare a rezistenței și, în cele din urmă, ar putea duce la o terapie inefficientă și la pierderi de colonii.

Utilizarea acestui produs medicinal veterinar trebuie să țină cont de informațiile locale privind susceptibilitatea paraziților țintă, dacă sunt disponibile. Se recomandă efectuarea de investigații suplimentare în cazul în care se suspectează rezistență, utilizând o metodă de diagnostic adecvată (de exemplu prin analize biologice sau analize moleculare (PCR)). În cazul în care există rezistență la piretroide, produsele care conțin flumetrin nu trebuie aplicate. Unde în trecut a fost observată rezistență la piretroide retestarea statutului actual al coloniei ar trebui să fie luată în considerare, deoarece revenirea susceptibilității poate avea loc într-o perioadă de câțiva ani. Rezistența confirmată trebuie raportată deținătorului autorizației de comercializare sau autorităților competente.

Activitatea de zbor este necesară pentru expunerea la substanța activă. În cazul unor perioade prelungite cu activitate de zbor redusă, de exemplu, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, eficacitatea poate fi redusă.

Succesul tratamentului trebuie monitorizat cu testele standard stabilite, cum ar fi monitorizarea continuă a căderii naturale de acarieni utilizând o tavă lipicioasă sau evaluarea încărcării cu căpușe la 100 de albine pentru a determina dacă este necesar un tratament de iarnă, de exemplu cu acid oxalic.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

După instalarea produsului medicinal veterinar, albinele se pot aglomera la urdiniș pentru câteva ore, în timpul reglării.

O ventilație adecvată a stupului trebuie asigurată în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate. Produsul medicinal veterinar nu a fost testat în timpul perioadelor cu vreme extrem de caldă. Produsul medicinal veterinar poate avea impact asupra ventilației stupului similar cu reductorul standard de la urdiniș și prin urmare, ar trebui să fie eliminat temporar, dacă se consideră necesar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se păstra punga cu benzile pentru stupul de albine în ambalajul exterior până la utilizare.

Deschideți punga chiar înainte de a utiliza benzile.

Se spală mâinile cu apă rece, după montarea benzilor pentru stupul de albine.

Precauții speciale pentru protecția mediului:


Nu este cazul.

3.6 Evenimente adverse

Albine melifere (*Apis mellifera*):

Nu există.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței produsului medicinal veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului autorizației de comercializare fie autorității naționale competente prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, prospectul pentru datele de contact respective.



3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu este cazul.

3.8 Interacțiunea cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

Nu se utilizează simultan cu alte acaricide împotriva varoozei.

3.9 Căi de administrare și doze

Utilizare în stup. Utilizați la urdiniș/intrarea în stupul de albine ca poartă.

Utilizați două benzi pentru fiecare stup de albine standard.

Subdozarea ar putea duce la o utilizare inefficientă și poate favoriza dezvoltarea rezistenței.

Aplicarea benzilor pentru stupul de albine:

Tratamentul trebuie început într-un timp scurt după cules și extracția mierii pentru a se asigura o activitate de zbor suficientă pentru un tratament eficient și dezvoltarea de albine sănătoase pentru iarnă. Tratamentul trebuie aplicat timp de cel puțin 9 săptămâni până la sfârșitul activității de zbor, dar nu mai mult de 4 luni. În cazul în care acarienii continuă să cadă la 9 săptămâni, tratamentul trebuie continuat. Astfel, tratamentul va acoperi, de obicei, faza critică cu potențialul de transfer orizontal al acarienilor, de exemplu, prin furtișag. Succesul tratamentului trebuie monitorizat, așa cum s-a menționat în secțiunea 3.4.


Benzile pentru stupul de albine trebuie să fie montate la intrare într-un mod în care albinele sunt forțate să intre sau să iasă din stup numai prin orificiile benzii. Întreaga suprafață și găurile benzii pentru stupul de albine nu trebuie să fie acoperite pentru a se asigura contactul albinelor cu banda și pentru a asigura ventilarea stupului. Benzile sunt proiectate să nu afecteze îndepărtarea albinelor moarte. Benzile nu trebuie tăiate.

Acest ambalaj conține doar benzile pentru stupul de albine, cu toate acestea, în funcție de tipul de stup de albine și dimensiunea urdinișului poate fi nevoie de alte instrumente, cum ar fi țințe, capse, cuie sau bucăți de lemn pentru a fixa banda pe poziție. Benzile pot fi fixate în moduri diferite, din interiorul sau din exteriorul stupului.

Pentru tipurile de stup cu o intrare largă două benzi pot fi fixate în linie (a se vedea figura 3a, b pentru exemplu stupi Boczonadi, Dadant, German normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast și Zander).

Pentru stupi cu o intrare mică benzile pot fi fixate ca un paralelipiped în fața intrării (a se vedea figura 3c, de exemplu, stupi Layens, A-Ž).

Exemple sunt ilustrate mai jos.



Nu reutilizați benzile pentru stupul de albine.

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

Datorită naturii benzilor pentru stupul de albine, supradozarea este puțin probabilă și semne de supradozare nu sunt așteptate.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Miere de albine: Zero zile.

Nu se utilizează în timpul culesului.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QP53AC05.

4.2 Farmacodinamie

Flumetrinul este un antiparazitar extern al grupului piretroidelor sintetice. Piretroidele sintetice modifică tranzițiile cinetice rapide între stările conducătoare (deschise) și neconducătoare (închise sau inactivate) ale canalelor de sodiu dependente de tensiune care stau la baza generării potențialelor de acțiune nervoasă. Astfel, ele mențin canalele de sodiu deschise pentru perioade lungi de timp, ceea ce duce la depolarizarea prelungită a celulelor nervoase, care este mediată de grupul α -ciano de pe

molecula de alcool fenoxi-fluorobenzilic. În studiile privind relația structură-activitate a unui număr de piretroide, interferența cu receptorii de o anumită conformație chirală a fost observată determinând astfel o activitate selectivă asupra ectoparaziților. Nici o activitate anti-colinesterază nu a fost observată cu acești compuși.

Au fost raportate cazuri de rezistență la piretroide ale acarienilor *Varroa*. Unele cazuri au fost atribuite modificărilor în exprimarea anumitor enzime de detoxifiere, dar cel mai frecvent mecanism de rezistență pare să fie prin mutații la nivelul receptorului țintă, din canalul de sodiu a membranelor celulelor nervoase menționate mai sus.

Într-un studiu de teren efectuat cu ajutorul coloniilor de albine infestate cu *Varroa destructor*, genotipuri de acarieni reziduali post-tratament ($\leq 5\%$ din populația de acarieni, deoarece eficacitatea a fost de $\geq 95\%$) au fost evaluate pentru prezența mutațiilor care conferă rezistență. Acarienii cu o mutație de rezistență au fost detectați la aproximativ 50% din colonii tratate cu produsul medicinal veterinar și în aproximativ 64% din coloniile tratate cu un alt piretroid autorizat. Procentul mediu de acarieni reziduali homozigoți rezistenți per colonie a fost de aproximativ 34% în coloniile tratate cu acest produs medicinal veterinar și 49% în coloniile tratate cu un alt piretroid autorizat. De aceea, tratamentul trebuie alternat (așa cum se explică în secțiunea 3.4), pentru a se preveni selectarea suplimentară pentru rezistență.

4.3 Farmacocinetică

Albinele sunt expuse la substanța activă prin contactul direct cu poarta de la intrarea și ieșirea din stup și indirect prin contactul social în interiorul stupului. Nu există o evaporare a substanței active.

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

Nu se cunosc.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani. Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: utilizați imediat. Orice produs medicinal veterinar neutilizat trebuie eliminat.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Pungă din folie poliester/aluminiu/polietilenă de joasă densitate care conține 10 benzi pentru stupul de albine, ambalate într-o cutie din carton.

Dimensiuni de ambalaj: cutie din carton care conține 1 pungă din folie sau 10 pungi din folie.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere. Produsul medicinal veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece flumetrin poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice.

Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile produsului medicinal veterinar respectiv.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco

7. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

220027

8. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI

Data primei autorizări: 09.02.2017

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

LL. AAAA


10. CLASIFICAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).



ANEXA III
ETICHETAREA ȘI PROSPECTUL



A. ETICHETAREA

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie din carton

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PolyVar Yellow 275 mg benzi pentru stupul de albine

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare bandă pentru stupul de albine 275 mg flumetrin.

3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 benzi pentru stupul de albine
100 benzi pentru stupul de albine

4. SPECII ȚINTĂ

Albine melifere (*Apis mellifera*).

5. INDICAȚII

6. CĂI DE ADMINISTRARE

Utilizare în stup.
Utilizați la urdiniș /intrarea în stupul de albine ca poartă.

7. PERIOADE DE AȘTEPTARE

Perioada de așteptare:
Miere de albine: Zero zile.
Nu se utilizează în timpul culesului.


8. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}
După deschidere a se utiliza imediat.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

10. MENȚIUNEA „A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE”

A se citi prospectul înainte de utilizare.



11. **MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.

12. **MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

13. **NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Elanco logo

14. **NUMERELE AUTORIZAȚIILOR DE COMERCIALIZARE**

220027

15. **NUMĂRUL SERIEI**

Lot {număr}

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Pungă din folie

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PolyVar Yellow 275 mg benzi pentru stupul de albine

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare bandă pentru stupul de albine 275 mg flumetrin.

3. SPECII ȚINTĂ

Albine melifere (*Apis mellifera*).

4. CĂI DE ADMINISTRARE

Utilizare în stup.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

5. PERIOADE DE AȘTEPTARE

Perioada de așteptare:

Miere de albine: Zero zile.

Nu se utilizează în timpul culesului.

6. DATA EXPIRĂRII

Exp. {ll/aaaa}

După deschidere a se utiliza imediat.

7. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

8. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco logo

9. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}



B. PROSPECTUL

PROSPECTUL



1. Denumirea produsului medicinal veterinar

PolyVar Yellow 275 mg benzi pentru stupul de albine

2. Compoziție

Fiecare bandă pentru stupul de albine conține:

Substanță activă:

Flumetrin 275 mg

Benzi galbene, din material plastic cu 15 găuri.

3. Specii țintă

Albine melifere (*Apis mellifera*).

4. Indicații de utilizare

Pentru tratamentul varoozei la albine melifere cauzată de acarienii *Varroa destructor*.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazuri de rezistență cunoscută împotriva piretroidelor așa cum este descris în secțiunea "Atenționări speciale", subsecțiunea "Atenționări speciale".

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Trebuie luată în considerare posibilitatea ca alte colonii situate pe aceeași stupină să poată fi o sursă de reinfestare cu *Varroa destructor*, iar acestea trebuie tratate simultan.

Utilizarea inutilă a antiparazitelor sau utilizarea care nu respectă instrucțiunile din Rezumatul caracteristicilor produsului poate accentua presiunea de selecție a rezistenței și poate duce la reducerea eficacității. Decizia de a utiliza produsul medicinal veterinar trebuie să se bazeze pe confirmarea speciei și a încărcăturii de paraziți sau a riscului de infestare pe baza caracteristicilor sale epidemiologice, pentru fiecare stup de albine.

Produsul medicinal veterinar trebuie să fie utilizat ca parte a unui program integrat de combatere a *Varroa*.

Rezistența la piretroide a fost raportată la *Varroa destructor* la albinele melifere. Conform datelor publicate în literatură (2024), rezistența la flumetrin a *Varroa destructor* în Turcia a variat de la 51% la 94%.

În plus, rezistența la flumetrin a devenit larg răspândită la nivel global, evidențiind mutațiile predominante în țările mediteraneene.

Ca o metodă eficientă pentru a reduce riscul de selecție a rezistenței, produsele care conțin flumetrin – ca și alte acaricide – nu trebuie utilizate în ani consecutivi. În schimb, o rotație strictă cu produse care conțin substanțe active din alte clase chimice, ar trebui efectuată. În funcție de situația de rezistență regională o pauză de tratament mai mult de un an poate fi necesară. Deoarece flumetrinul și tau-fluvalinatul fac parte din aceeași clasă, nu sunt potrivite pentru a se roti între ele. Utilizarea inadecvată a produsului medicinal veterinar ar putea duce la un risc crescut de dezvoltare a rezistenței și, în cele din urmă, ar putea duce la o terapie inefficientă și la pierderi de colonii.

Utilizarea acestui produs medicinal veterinar trebuie să țină cont de informațiile locale privind susceptibilitatea paraziților țintă, dacă sunt disponibile. Se recomandă efectuarea de investigații suplimentare în cazul în care se suspectează rezistență, utilizând o metodă de diagnostic adecvată (de exemplu prin analize biologice sau analize moleculare (PCR)). În cazul în care există rezistență la piretroide, produsele care conțin flumetrin nu trebuie aplicate. Unde în trecut a fost observată rezistență la piretroide retestarea statutului actual al coloniei ar trebui să fie luată în considerare, deoarece revenirea susceptibilității poate avea loc într-o perioadă de câțiva ani. Rezistența confirmată trebuie raportată deținătorului autorizației de comercializare sau autorităților competente.

Activitatea de zbor este necesară pentru expunerea la substanța activă. În cazul unor perioade prelungite cu activitate de zbor redusă, de exemplu, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, eficacitatea poate fi redusă.

Succesul tratamentului trebuie monitorizat cu testele standard stabilite, cum ar fi monitorizarea continuă a căderii naturale de acarieni utilizând o tavă lipicioasă, sau evaluarea încărcării cu căpușe la 100 de albine pentru a determina dacă este necesar un tratament de iarnă, de exemplu cu acid oxalic.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

După instalarea produsului medicinal veterinar albinele se pot aglomera la urdiniș pentru câteva ore, în timpul reglării.

O ventilație adecvată a stupului trebuie asigurată în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate. Produsul medicinal veterinar nu a fost testat în timpul perioadelor cu vreme extrem de caldă. Produsul medicinal veterinar poate avea impact asupra ventilației stupului similar cu reductorul standard de la urdiniș și prin urmare, ar trebui să fie eliminat temporar, dacă se consideră necesar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

A se păstra punga cu benzile pentru stupul de albine în ambalajul exterior până la utilizare. Deschideți punga chiar înainte de a utiliza benzile.
Se spală mâinile cu apă rece, după montarea benzilor pentru stupul de albine.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Nu se utilizează simultan cu alte acaricide împotriva varoozei.

Supradozare:

Datorită naturii benzilor pentru stupul de albine, supradozarea este puțin probabilă și semne de supradozare nu sunt așteptate.

Incompatibilități majore:

Nu se cunosc.

7. Evenimente adverse

Albine melifere (*Apis mellifera*):

Nu există.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul autorizației de comercializare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: farmacovigilenta@ansvsa.ro sau icbmrv@icbmrv.ro

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Utilizare în stup. Utilizați la urdiniș /intrarea în stupul de albine ca poartă.

Utilizați două benzi pentru fiecare stup de albine standard.

Subdozarea ar putea duce la o utilizare inefficientă și poate favoriza dezvoltarea rezistenței.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Aplicarea benzilor pentru stupul de albine:

Tratamentul trebuie început într-un timp scurt după cules și extracția mierii pentru a se asigura o activitate de zbor suficientă pentru un tratament eficient și dezvoltarea de albine sănătoase pentru iarnă. Tratamentul trebuie aplicat timp de cel puțin 9 săptămâni până la sfârșitul activității de zbor, dar nu mai mult de 4 luni. În cazul în care acarienii continuă să cadă la 9 săptămâni, tratamentul trebuie continuat. Astfel, tratamentul va acoperi, de obicei, faza critică cu potențialul de transfer orizontal al acarienilor, de exemplu, prin furtișag. Succesul tratamentului trebuie monitorizat, așa cum s-a menționat în secțiunea "Atenționări speciale", subsecțiunea "Atenționări speciale".


Benzile pentru stupul de albine trebuie să fie montate la intrare într-un mod în care albinele sunt forțate să intre sau să iasă din stup numai prin orificiile benzii. Întreaga suprafață și găurile benzii pentru stupul de albine nu trebuie să fie acoperite pentru a se asigura contactul albinelor cu banda și pentru a asigura ventilarea stupului. Benzile sunt proiectate să nu afecteze îndepărtarea albinelor moarte. Benzile nu trebuie tăiate.

Acest ambalaj conține doar benzile pentru stupul de albine, cu toate acestea, în funcție de tipul de stup de albine și dimensiunea urdinișului poate fi nevoie de alte instrumente, cum ar fi țințe, capse, cuie sau bucăți de lemn pentru a fixa banda pe poziție. Benzile pot fi fixate în moduri diferite, din interiorul sau din exteriorul stupului.

Pentru tipurile de stup cu o intrare largă două benzi pot fi fixate în linie (a se vedea figura 3a, b pentru exemplu stupi Boczonadi, Dadant, German normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast și Zander).

Pentru stupi cu o intrare mică benzile pot fi fixate ca un paralelipiped în fața intrării (a se vedea figura 3c, de exemplu, stupi Layens, A-Ž).

Exemplele sunt ilustrate la sfârșitul prospectului.



Nu reutilizați benzile pentru stupul de albine.

10. Perioade de așteptare

Miere de albine: Zero zile.

Nu se utilizează în timpul culesului.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

Nu utilizați acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă și cutie după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: utilizați imediat. Orice produs medicinal veterinar neutilizat trebuie eliminat.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere. Produsul medicinal veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece flumetrin poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice.

Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea produselor medicinale veterinare

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele autorizațiilor de comercializare și dimensiunile ambalajelor

220027

Pungă din folie poliester/aluminiu/polietilenă de joasă densitate, care conține 10 benzi pentru stupul de albine, ambalate într-o cutie din carton.

Dimensiuni de ambalaj: cutie din carton care conține 1 pungă din folie sau 10 pungi din folie.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

LL. AAAA

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Uniunii privind produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Date de contact

Deținătorul autorizației de comercializare și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germania
Tel: +40 376300400
PV.ROU@elancoah.com

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Germania

17. Alte informații

Albinele sunt expuse la substanța activă prin contactul direct cu poarta de la intrarea și ieșirea din stup și indirect prin contactul social în interiorul stupului. Nu există o evaporare a substanței active.