

## RespiSure EU

### Vaccin inactivat pentru suine impotriva pneumoniei micoplasmice

#### FORMA

Emulsie pentru administrare pe cale IM.

#### COMPOZITIE

O doza (2ml) contine cel putin 6000 RU\* antigen de *Mycoplasma hyopneumoniae* si un adjuvant uleios Amfigen.

\* Unitati relative ELISA

#### PROPRIETATI

Vaccinul contine tulpini inactive *Mycoplasma hyopneumoniae* si un adjuvant uleios Amfigen care potenteaza raspunsul imunologic (imunitate mediate umorala si celulara). Debutul imunitatii se realizeaza la 2 saptamani dupa vaccinare. Studiile Pfizer demonstreaza eficienta crescuta impotriva pneumoniei enzootice la suine. Protectia este asigurata pe toata perioada de ingrasare. Se recomanda inceperea programului profilactic de vaccinare a intregului efectiv.

#### INDICATII

Imunizarea purcelor sanatosi impotriva pneumoniei micoplasmice.

#### CONTRAINdicatii

Vaccinul este efficient doar daca este administrat animalelor sanatoase. Nivelul raspunsului imunitar poate sa nu fie sufficient daca la momentul vaccinarii animalele sunt suspectate ca fiind intr-un stadiu evolutiv al bolii infectioase, sunt epuizate, sunt infestate sau supuse unui stres sau daca vaccinul nu este administrat conform indicatiilor din prospect.

#### EFFECTE ADVERSE


Este posibil sa apara o reactie anafilactica. Daca se produce o reactie anafilactica, se va administra adrenalina sau o alta medicatie corespunzatoare.

#### INTERACTIUNI

Nu se cunosc.

#### POSOLOGIE SI METODA DE ADMINISTRARE

Respisure este indicat pentru a fi administrat la purcei in cantitate de 2ml pe purcel pe cale intramusculara. Prima doza se administreaza in prima saptamana de viata iar a 2-a doza la un interval de 2-4 saptamani mai tarziu. Se agita bine inainte de utilizare.





### **TIMP DE ASTEPTARE**

Nu este cazul.

### **TERMEN DE VALABILITATE**

Dupa ambalarea pentru comercializare: 36 luni

Dupa prima deschidere: 10 ore

### **CONDITII DE DEPOZITARE**

Se va depozita la temperature intre 2° si 8°C. Nu se va congeal.

Se utilizeaza intreg continutul flaconului dupa desigilare.

### **PRECAUTII SPECIALE DE UTILIZARE**

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE UTILIZARE. A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR.

**NUMAI PENTRU TRATAMENTUL ANIMALELOR**

**NUMAI PE BAZA DE RETETA VETERINARA**

### **PREZENTARE**

Flacoane de plastic sau sticla de 10, 50, 125 doze

Cod veterinary ATC: QI09A

**Producatorul produsului medicinal si locul de productie:**

Pfizer Animal Health SA., Rue Laid Burniat, 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia

**Detinatorul autorizatiei de comercializare pentru Romania:**

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Koelblgasse 8-10, 1030 Vienna, Austria

**Persoana/compania responsabila:**

Eli Lilly Suisse SA

Str. Buzesti nr. 61, bl A6, et 4, ap 26, sector 1, Bucuresti, Romania

