

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

TAbic IB VAR, tablete efervescente pentru suspensie pentru pui de gaina.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 doza de vaccin contine:

Virus viu atenuat al Bronsitei Infectioase Aviare, tulipa 233A, min. $10^{3.2}$ DIE₅₀, max. $10^{5.1}$ DIE₅₀*.

* DIE₅₀=50% Doza Infectioasa Embrionara

Pentru lista completa a excipientilor, vezi sectiunea 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Tablete efervescente pentru suspensie.

Tablete rotunde de culoare alb închis,

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Pui de gaina (broileri, ouatoare si pentru reproductie).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Acest vaccin este utilizat pentru imunizarea activa a puilor de gaina destinați consumului de carne, ouă și pentru reproductie cu scopul reducerii mortalității, semnelor clinice și leziunilor de Bronșită Infectioasă Aviare.

Vaccinul este recomandat pentru administrare la orice varsta, începând cu prima zi de viață. O singura vaccinare conferă creșterea rapidă a imunității împotriva virusului bronșitei infectioase. Imunitatea completă este realizată la 21 zile după administrare și durează 42 zile. Repetarea vaccinării (la varsta de 14 zile pentru puii vaccinați la o zi) conferă protecție completă în loturile de pasari de carne care sunt sacrificiate la varsta de 7-8 săptămâni.

Gainile de reproductie și cele ouatoare ar trebui, de asemenea, revaccinate ulterior, în conformitate cu programul de vaccinare stabilit.

4.3 Contraindicații

A nu se utiliza la pasările bolnave sau stresate.

A nu se utiliza tabletele care provin din foliile perforate sau deteriorate.

A nu se pastra cantitati de vaccin reconstituit in vederea administrarii in alta zi.

A nu se administra doze mai mici decat cele recomandate.

A nu se reconstituie vaccinul cu apa cu urme de dezinfecțanti sau detergenți.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă.

Dizolvati tableta numai in apa curata.

Vaccinat pasarile numai dupa ce tableta este complet dizolvata.

Utilizati vaccinul reconstituit in cel mult 2 ore dupa preparare.

Numai pasarile sanatoase clinic ar trebui vaccinate.

Imunocompetenta pasarilor poate fi compromisa de o serie de factori, inclusiv boli imunosupresoare, malnutritie si stres.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare, inclusiv precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Virusul vaccinal se raspandeste in teren; trebuie acordată atenție pentru a preveni astfel de răspândire in locuri cu aglomerari de pasari de diferite varste.

TAbic IB VAR protejează puii de gaina împotriva semnelor clinice respiratorii cauzate de tulpina 233A și nu trebuie utilizat ca inlocuitor pentru alte vaccinuri IB.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Operatorul trebuie să poarte mănuși, ochelari și mască pentru a se evita contactul cu produsul.

În caz de ingestie sau contact accidental al vaccinului cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul sau eticheta.

Răspunsul imunologic la antigenul vaccinal va fi redus prin depozitare sau administrare inadecvată.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Nu s-au observat reactii adverse la pasarile vaccinate in studiile de siguranta (cu cel putin de 10 ori doza recomandata).

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Vaccinul TAbic IB Var poate fi administrat gainilor ouatoare incepand cu prima zi de viata.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

A fost observata compatibilitate intre TAbic IB VAR si vaccinul NDV când se administrează la aceeasi varsta (de 1 zi).

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Acest vaccin este destinat utilizarii prin inhalare. Poate fi administrat prin pulverizare sau aerosol. Pentru cele mai bune rezultate, pasarile ar trebui vaccinate la varsta de 1 zi.

Presati folia pentru eliberarea tabletei in apa fiarta si racita. Asteptati 1-2 minute pentru dizolvarea completa si apoi amestecati usor pentru dispersia omogena a vaccinului.

Dupa reconstituirea cu apa, s-a stabilit ca vaccinul este activ pentru o perioada de maxim 2 ore, insa este de preferat ca el sa fie utilizat imediat dupa reconstituire.

VOLUMUL RECONSTITUIT RECOMANDAT (ml) :

Doza	Pulverizare*	Aerosol*
1000	50-300	100-150
2000	100-600	200-300
2500	125-750	250-375
5000	250-1500	500-750
10000	500-3000	1000-1500

*Cantitatea exacta de apa depinde de puterea de pulverizare a dispozitivului de pulverizare sau de aerosoli utilizat.

Pulverizare: Un pulverizator de tipul celor utilizate in gradina poate fi utilizat pentru pulverizare la pui de o zi, imediat dupa iesirea din oua sau in elocitoare. Pentru pasari mai in varsta, utilizati un aparat de pulverizare electric cu o pulverizare mai uniforma; picaturile nu trebuie sa fie mai mici de 100 microni.

Aerosol: Dispozitivul electric de aerosoli trebuie sa produca picaturi mici : 40-100 microni.

Aceasta metoda de administrare este utilizata pentru repetarea vaccinarii la pasari mai in varsta.

Recomandari privind administrarea corecta

Aparatele si echipamentele utilizate pentru pulverizare si aerosoli trebuie sa fie curatare utilizand apa fiarta trecuta prin toate orificiile.

Functionarea aparatelor trebuie sa fie testata inainte de vaccinare.

Dispozitivele de pulverizare si aerosoli trebuie sa fie mentinute la 60-70 cm deasupra pasarilor.

Inainte de pulverizare asigurati-vă ca locul este in semiintuneric, cu ventilatia si caldura oprite. Oferiti pasarilor conditii lipsite de stres inainte si dupa vaccinare.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

S-a constatat ca acest vaccin este sigur dupa inocularea puilor SPF de 1 zi prin metoda picaturilor in ochi, utilizand echivalentul a cel putin de 10 oridoza recomandata.

4.11 Timp de așteptare

0 zile.

5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: produse imunologice pentru pasari, vaccinuri vii virale atenuate.

Codul veterinar ATC: QI01AA03

TAbic IB VAR (tulpina 233A) este un vaccin viu care stimuleaza imunitatea activa impotriva Bronsitei Infectioase. Vaccinul contine un virus viu atenuat de Bronsita Infectioasa multiplicat in oua fertile de la loturi SPF, apoi liofilizat. tabletat si ambalat in folii.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Trehalosa
Carbonat hidrogen de sodiu
Acid citric anhidru
Magneziu stearat

6.2 Incompatibilități

In absenta studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu ar trebui utilizat impreuna cu alte produse medicinal veterinare.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare : 2 ani.

Perioada de valabilitate pentru vaccinul reconstituit: 2 ore.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C)

A se proteja de lumină.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Tablete (x 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10 000 doze) ambalate in folii din strat dublu de aluminiu Alum Soft Silver (PVC/PVDC) – Alum Argint (PVC). Fiecare folie contine 10 tablete.

PVC: Poly Vinyl Chloride; PVDC: PolyVinylidene Chloride

Cutii din carton continand 1 folie (10 tablete).

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

ABIC POLSKA Sp. Z o.o.
63-100 SREM, ul. Szkolna 17
POLONIA
tel: (0 61) 28 30 773
fax: (0 61) 28 30 170
e-mail: office@medivet.pl

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizari:15.10.2014

Data ultimei reinnoiri:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE**

Importul, vânzarea, eliberarea și/sau utilizarea de TAbic IB VAR este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, în conformitate cu politica națională referitoare la sănătatea animalelor. Orice persoană care intenționează să importe, să vândă, să elibereze și/sau să utilizeze TAbic IB VAR trebuie să consulte autoritatea competență în domeniul Statului Membru respectiv, referitor la politicile de vaccinare existente, înainte de a efectua importul, vânzarea, utilizarea și/sau furnizarea.

ANEXA III

ETCHETARE ȘI PROSPECT

A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR**Cutie carton****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Tabic IB VAR, tablete efervescente pentru suspensie/pui de gaina

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

IBV, tulpina 233Amin. $10^{3.2}$ DIE₅₀/doza, max. $10^{5.1}$ DIE₅₀/doza.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Tablete efervescente pentru suspensie.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 tablete de 1000 (2000, 2500, 5000 sau 10000) doze.

5. SPECII ȚINTĂ

Pui de găini (broileri, ouatoare si pentru reproductie).

6. INDICAȚII**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Acest vaccin poate fi administrat prin inhalare(pulverizare sau aerosoli).

8. TEMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. ATENȚIONARE SPECIALĂ , DUPĂ CAZ

Citii prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se pastra la frigider, la temperaturi de la 2°C la 8°C, ferit de lumina.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: cititi prospectul produsului.

13. MENTIUNE „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

A se elibera numai pe baza de prescriptie medical veterinara.

A se administra numai sub supravegherea unui medic veterinar.

14. MENTIUNE „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la vederera si îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

ABIC POLSKA Sp. Z o.o.
63-100 SREM, ul. Szkolna 17
POLONIA

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Numar Lot :

INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRIPTE PE FOLII**Folie aluminiu****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

TABIC IB VAR, tablete efervescente pentru suspensie/pui de gaina.

2. NUMELE DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

ABIC POLSKA Sp. Z o.o.

3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1000 (2000, 2500, 5000, 10 000) doze.

4. DATA EXPIRARII

Data expirarii: {lună/an}

5. NUMARUL LOTULUI

Numar lot.....

5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

B. PROSPECT

PROSPECT pentru

Tabic IB VAR, tablete efervescente pentru suspensie/pentru pui de gaini

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare

ABIC POLSKA Sp. Z o.o.
63-100 SREM, ul. Szkolna 17
POLONIA

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Tabic IB VAR, tablete efervescente pentru suspensie/ pentru pui de găina.

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

1 doza de vaccin contine:

Virus viu atenuat de Bronsita Infectioasa Aviara, tulipa 233A, min. $10^{3.2}$ DIE₅₀, max. $10^{5.1}$ DIE₅₀*.

* DIE₅₀=50% Doza Infectioasa Embrionara

Tablete rotunde de culoare alb închis

4 INDICAȚII

Acest vaccin este utilizat pentru imunizarea activa a puilor destinați consumului de carne, ouă și pentru reproductie cu scopul reducerii mortalității, semnelor clinice și leziunilor de Bronsită Infectioasă aviara.

Vaccinul este recomandat pentru administrare la orice varsta, începând cu prima zi de viață. O singura vaccinare conferă creșterea rapidă a imunității împotriva virusului bronșitei infectioase. Imunitatea completă este realizată la 21 zile după administrare și durează 42 zile. Repetarea vaccinării (la varsta de 14 zile pentru puii vaccinați la 1 zi) conferă protecție completă în loturile de pasari de carne care sunt sacrificiate la varsta de 7-8 săptămâni.

Pasările de reproductie și cele ouătoare ar trebui, de asemenea, revaccinate ulterior, în conformitate cu programul de vaccinare stabilit.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la pasările bolnave sau stresate.

Nu se utilizează tabletele care provin din foliile perforate sau deteriorate.

A nu se păstrează cantități de vaccin reconstituit în vederea administrării în alta zi.

A nu se administrează doze mai mici decât cele recomandate.

A nu se reconstituie vaccinul cu apă cu urme de dezinfecțanți sau detergenți.

6. REACȚII ADVERSE

Nu s-au observat reacții adverse la pasările vaccinate în cadrul studiilor de siguranță (cu

cel putin de 10 ori doza recomandata).
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Pui de găini (broileri, ouatoare si pentru reproductie).

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Acest vaccin este destinat utilizarii prin inhalare. Poate fi administrat prin pulverizare sau aerosol. Pentru cele mai bune rezultate, pasarile ar trebui vaccinate la varsta de 1 zi.

Presati folia pentru eliberarea tabletei in apa fiarta si racita. Asteptati 1-2 minute pentru dizolvarea completa si apoi amestecati usor pentru dispersia omogena a vaccinului.
Dupa reconstituirea cu apa, s-a stabilit ca vaccinul este activ pentru o perioada de maxim 2 ore, insa este de preferat ca el sa fie folosit imediat dupa reconstituire.

VOLUMUL RECONSTITUIT RECOMANDAT (ml) :

Doza	Pulverizare*	Aerosol*
1000	50-300	100-150
2000	100-600	200-300
2500	125-750	250-375
5000	250-1500	500-750
10000	500-3000	1000-1500

*Cantitatea exacta de apa depinde de puterea de pulverizare a dispozitivului de pulverizare sau aerosoli utilizat.

Pulverizare: Un pulverizator de tipul celor utilizate in gradina poate fi utilizat pentru pulverizare la pui de o zi, imediat dupa iesirea din oua sau in clocitoare. Pentru pasari mai in varsta, utilizati un aparat de pulverizare electric cu o pulverizare mai uniforma; picaturile nu trebuie sa fie mai mici de 100 microni.

Aerosol: Dispozitivul electric de aerosoli trebuie sa produca picaturi mici : 40-100 microni.

Aceasta metoda de administrare este utilizata pentru repetarea vaccinarii la pasari mai in varsta.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Dispozitivele si echipamentele utilizate pentru pulverizare si aerosoli trebuie sa fie curatare utilizand apa fiarta trecuta prin toate orificiile.

Functionarea aparatelor trebuie sa fie testata inainte de vaccinare.

Dispozitivele de pulverizare si aerosoli trebuie sa fie mentinute la 60-70 cm deasupra pasarilor.

Inainte de pulverizare asigurati-vă ca locul este in semiintuneric, cu ventilatia si caldura oprite. Oferiti pasarilor conditii lipsite de stres inainte si dupa vaccinare.

10. TEMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

- A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.
- A se păstra la frigider, la temperaturi de la 2°C la 8°C, ferit de lumina.
- Valabilitate după reconstituirea cu apă: 2 ore.
- A nu se utilizează după data expirării menționată pe folie.

12. ATENȚIONARI SPECIALE

Atenționari speciale pentru fiecare specie tinta:

Dizolvati tableta numai in apa curata.

Vaccinati pasarile numai dupa ce tableta este complet dizolvata.

Utilizati vaccinul reconstituit in nu mai mult de 2 ore dupa preparare.

Numai pasarile sanatoase clinic ar trebui vaccinate.

Imunocompetenta pasarilor poate fi compromisa de o serie de factori, inclusiv boli imunosupresoare, malnutritie si stres.

Precautii speciale pentru utilizare la animale :

Virusul vaccinal se raspandeste în teren, drept urmare nu se recomanda expunerea lui in locuri cu aglomerari de pasari de diferite varste.

TAbic IB VAR protejeaza pasarile impotriva semnelor clinice respiratorii cauzate de tulpina 233A si nu ar trebui utilizat ca inlocuitor pentru alte vaccinuri IB.

Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale

Operatorul trebuie să poarte mănuși, ochelari și mască pentru a se evita contactul cu produsul.

În caz de ingestie sau contact accidental al vaccinului cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul sau eticheta.

Răspunsul imunologic la antigenul de vaccin va fi redus prin depozitare sau administrare inadecvate.

Perioada de ouat :

Vaccinul viu TAbic IB VAR poate fi administrat la pasari ouatoare vaccinate din prima zi de viață.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

A fost observata compatibilitate intre TAbic IB VAR si vaccinul NDV cand se administrează la aceeasi varsta (de 1 zi).

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

S-a constatat ca acest vaccin este sigur dupa inocularea puilor SPF de 1 zi prin metoda picaturilor in ochi, utilizand echivalentul a cel putin de 10 oridoza recomandata.

Incompatibilități

In absenta studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu ar trebui utilizat impreuna cu alte produse medicinal veterinar.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați deținătorul autorizației de comercializare.

Marimea ambalajului:

O cutie carton contine 1 folie (10 tablete a 1000, 2000, 2500, 5000, 10 000 doze).