

**ANEXA I**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**



## **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**TABIC M.B.**, vaccin viu, tablete efervescente pentru pui de găină împotriva bursitei infecțioase

## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

### **Substanță activă per doză:**

IBD virus, tulipa M.B. ....minimum  $10^{2.5}$  DIE<sub>50</sub>, maxim  $10^{3.1}$  DIE<sub>50</sub>

### **Excipienti**

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Tablete efervescente pentru reconstituire cu apa.

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă**

Găini (rase de carne, ouatoare și pentru reproducție): pui în vîrstă de 10 – 12 zile.

### **4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Acest vaccin este utilizat la pui pentru prevenirea bursitei infecțioase. Pentru cele mai bune rezultate, pasarile trebuie vaccinate la varsta de 10-12 zile.

**Instalarea imunității:** Începând cu 17 a zi postvaccinare.

**Durata imunității:** O singură vaccinare conferă o bună protecție pentru 45 de zile.

### **4.3 Contraindicații**

Nu există.

### **4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

Nu există.

### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare:**

- pasarile ce urmează să fie vaccinate trebuie să fie sănătoase și să nu fie expuse la condiții de stres ca: malnutriție, aglomerare sau temperaturi excesive;
- vaccinurile vii sunt sensibile la lumina soarelui, căldura, substanțe dezinfectante și detergenti; drept urmare nu se recomandă expunerea vaccinului la aceste condiții;
- asigurați doza recomandată;
- nu tablete din folii deteriorate și gaurite;
- nu pastrați vaccin reconstituit pentru administrarea lui într-o zi ulterioară;
- tabletele din foliile deschise și vaccinul reconstituit trebuie utilizate imediat;
- presați folia pentru eliberarea tabletei în apă fiartă și racită. Asigurați-vă de dizolvarea completă a tabletei, așteptați 1-2 minute și apoi amestecați ușor pentru dispersia omogenă a vaccinului.
- opriți orice tratament sau dezinfectie a apei de băut cu 24 ore înainte de vaccinare;
- asigurați-vă că există suficiente adaptoare astfel încât toate pasarile vor avea acces la apă în același timp;
- apă și adaptoarele trebuie să fie curate și fără urme de dezinfectanți;
- nu incalziti soluția continând vaccinul;
- inserați pasarile prin oprirea sursei de apă cu 1-2 ore înainte de vaccinare;
- nu oferăți apă până cand nu este consumat tot vaccinul.

#### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu este cazul.

#### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-administrare, auto-injectare, ingestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Nu se cunosc.

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat**

##### Gestație:

Nu este cazul.

##### Lactație:

Nu este cazul.

##### Păsări ouătoare:

Nu sunt restricții.

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Studiile de siguranță și eficacitate au demonstrat că imunizarea puiilor de găină cu produsul Tabic MB, conform recomandărilor de utilizare (la vârstă de 10 – 12 zile), nu influențează negativ vaccinarea acestora cu alte vaccinuri în zile diferite (ex: vaccinarea contra bolii de Newcastle și bronșitei infecțioase la vârstă de 4 zile cu rapel la vârstă de 14 zile zile).

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Pentru cele mai bune rezultate, pasările ar trebui vaccinate la varsta de 10-12 zile.

Consultati intotdeauna medicul veterinar pentru un program de vaccinare adevarat.

Acest vaccin poate fi administrat în apă de baut sau pe cale oculo-conjunctivală.

##### **Administrare în apă de băut:**

Este recomandata reconstituirea cantitatii adevarate de tablete pentru vaccinare, in 1/5 din volumul zilnic al apei de baut. Acest volum de apă continand vaccinul ar trebui consumat in 2-3 ore. Pentru neutralizarea clorului in apă de baut, utilizati un neutralizator de clor comercial conform instructiunilor de utilizare, sau adaugati 50 ml lapte smantanit sau 5 g lapte smantanit praf la fiecare litru de apă. Dupa omogenizarea laptelui, asteptati 5 minute, apoi adaugati vaccinul. Adaptorile si sistemul de alimentare cu apă de baut trebuie sa fie curatare cu cateva zile inainte de vaccinare cu otet ( in concentratie de 0,5-0,8%) sau cu acid citric (200-300 g/1000 litri).

##### **Administrarea de picături pe cale oculo-conjunctivală:**

Tableta trebuie dizolvata in apă fiarta si racita; 1000 doze de vaccin in 30-50 ml apă

(cantitatea exactă de apă depinde de tipul picuratorului utilizat).

Se contentioneaza pasarea (puiul) si se administrează in ochi o picatura de vaccin. Se asteapta ca picatura sa fie "absorbita" de cavitatea oculo-conjunctivală.

#### **4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Vaccinul este sigur consecutiv administrării a 10 doze vaccinale la pui SPF.

#### **4.11 Timp de așteptare**

Zero zile.



## **5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE**

Grupa farmacoterapeutică: vaccin viu, antiviral contra *Bursitei Infecțioase la păsări*.  
Codul veterinar ATC: QI01AD09

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipientilor**

Bicarbonat de sodiu  
Acid citric anhidru  
Povidona  
Magneziu stearat

### **6.2 Incompatibilități**

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal (cu excepția apei utilizate pentru reconstituirea vaccinului).

### **6.3 Perioadă de valabilitate**

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: imediat după reconstituire (diluare).

### **6.4 Precauții speciale pentru depozitare**

A se pastra la frigider, la temperaturi de la 2°C la 8°C, ferit de lumina ;

### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

Cutie x 1 folie din aluminiu x 10 tablete de 100, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10000 doze

### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

S.C. ATICO INTERNATIONAL VETERINARY S.R.L.

Bdul. I.C. Bratianu, nr. 248

Constanta

ROMANIA

tel: 0241-512.369

fax: 0241-693.973

e-mail: office@atico.ro

## **8. NUMĂRUL (AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**



21.12.2005/19.07.2011

**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

***INTERDICTII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE***

Importul, vânzarea, eliberarea și/sau utilizarea de TABIC M.B. este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, în conformitate cu politica națională referitoare la sănătatea animalelor. Orice persoană care intenționează să importe, să vândă, să elibereze și/sau să utilizeze TABIC M.B. trebuie să consulte autoritatea competentă în domeniu a Statului Membru respectiv, referitor la politicile de vaccinare existente, înainte de a efectua importul, vânzarea, utilizarea și/sau furnizarea.



**A. ETICHETARE****INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie carton x 1 folie din aluminiu x 10 tablete

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**TABIC M.B.**, vaccin viu, tablete efervescente pentru pui de găină împotriva bursitei infecțioase

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE****Substanță activă per doză:**

IBD virus, tulipina M.B. .... minimum  $10^{2,5}$  DIE<sub>50</sub>, maxim  $10^{3,1}$  DIE<sub>50</sub>

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Tablete efervescente pentru reconstituire cu apa.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Cutie carton x 1 folie din aluminiu x 10 tablete de 100, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10000 doze

**5. SPECII ȚINTĂ**

Găini (rase de carne, ouatoare și pentru reproducție): pui în vîrstă de 10 – 12 zile

**6. INDICAȚII**

Acest vaccin este utilizat la pui pentru prevenirea bursitei infecțioase. Pentru cele mai bune rezultate, pasarile trebuie vaccinate la varsta de 10-12 zile.

**Instalarea imunitatii:** Începând cu 17 a zi postvaccinare.

**Durata imunitatii:** O singură vaccinare conferă o bună protecție pentru 45 de zile.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Acest vaccin poate fi administrat în apă de băut sau pe cale oculo-conjunctivală (picaturi). Citiți prospectul înainte de utilizare.



**8. TEMPOR DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

**9. ATENȚIONARE SPECIALĂ , DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

**10. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

Dupa reconstituire (diluare) se va utiliza imediat.

**11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A se pastra la frigider, la temperaturi de la 2°C la 8°C, ferit de lumina.

**12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Eliminare: cititi prospectul produsului.

**13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

„Numai pentru uz veterinar”

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

Fabricarea, importul, detinerea, vânzarea, eliberarea și/sau utilizarea acestui produs medicinal veterinar este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întreg teritoriul sau numai pentru anumite zone ale teritoriului acestora, vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

S.C. ATICO INTERNATIONAL VETERINARY S.R.L.

Bdul. I.C. Bratianu, nr. 248

Constanta

ROMANIA



**16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS**

Serie:..... Lot:.....



**INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRISE PE UNITATILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

1 folie din aluminiu x 10 tablete de 100, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10000 doze

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

TABIC M.B. , vaccin viu, tablete efervescente pentru pui de găină împotriva Bursitei Infecțioase

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

S.C. ATICO INTERNATIONAL VETERINARY S.R.L.

**3. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

Valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: imediat după reconstituire (diluare).

**4. NUMĂRUL SERIEI**

Serie.....Lot.....

**5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.



ANNEKAHL 4

ANNEKAHL  
INTERNATIONAL  
ART GALLERY  
1976

**B.PROSPECT**



## PROSPECT

**TABIC M.B.**, vaccin viu, tablete efervescente pentru pui împotriva bursitei infecțioase

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

C. ATICO INTERNATIONAL VETERINARY S.R.L.

Bdul. I.C. Bratianu, nr. 248

Constanta

ROMANIA

tel: 0241-512.369

fax: 0241-693.973

e-mail: office@atico.ro

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**TABIC M.B.**, vaccin viu, tablete efervescente pentru pui de găină împotriva bursitei infecțioase

**3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI**

**Substanță activă per doză:**

IBD virus, tulpina M.B. .... minimum  $10^{2,5}$  DIE<sub>50</sub>, maxim  $10^{3,1}$  DIE<sub>50</sub>

**4. INDICAȚII**

Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Acest vaccin este utilizat la pui pentru prevenirea bursitei infecțioase. Pentru cele mai bune rezultate, pasarile trebuie vaccinate la varsta de 10-12 zile.

**Instalarea imunitatii:** Începând cu 17 a zi postvaccinare.

**Durata imunitatii:** O singură vaccinare a conferă o bună protecție pentru 45 de zile.

**5. CONTRAINDIKAȚII**

Nu există.

**6. REACȚII ADVERSE**

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

**7. SPECII ȚINTĂ**

Găini (rase de carne, ouatoare și pentru reproducție): pui în vîrstă de 10 – 12 zile.

**8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Pentru cele mai bune rezultate, pasarile ar trebui vaccinate la varsta de 10-12 zile.

O singură vaccinare a speciei tinta oferă acestora o protecție bună pentru toată perioada de creștere începând cu ziua a 17-a zi postvaccinare.

Consultați întotdeauna medicul veterinar pentru un program de vaccinare adecvat.



Acet vaccin poate fi administrat prin metoda apei de baut sau prin picaturi in ochi.  
Presati folia pentru eliberarea tabletei in apa fiarta si racita. Asigurati-vă de dizolvarea completa a tabletei, asteptati 1-2 minute si apoi amestecati usor pentru dispersia omogena a vaccinului.

#### **Administrarea în apa de băut:**

Este recomandata reconstituirea cantitatii adekvate de tablete pentru vaccinare, in 1/5 din volumul zilnic al apei de baut. Acet volum de apa continand vaccinul ar trebui consumat in 2-3 ore. Pentru neutralizarea clorului in apa de baut adaugati 50 ml lapte smantanit sau 5 g lapte smantanit praf la fiecare litru de apa. Dupa omogenizarea laptei, asteptati 5 minute, apoi adaugati vaccinul. Adaptorile si sistemul de alimentare cu apă de baut trebuie sa fie curățate cu cateva zile inainte de vaccinare cu otet (în concentrație de 0.5-0.8%) sau cu acid citric (200-300 g/1000 litri).

#### **Administrarea de picături pe cale oculo-conjunctivală:**

Tableta trebuie dizolvata in apa fiarta si racita; 1.000 doze de vaccin in 30-50 ml apă (cantitatea exactă de apa depinde de tipul picuratorului utilizat).

Se contentioneaza pasarea (puiul) si se administrează in ochi o picatura de vaccin. Se asteapta ca picatura sa fie "absorbita" de cavitatea oculo-conjunctivală.

#### **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Vezi pct 12.

#### **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

#### **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor.

A se pastra la frigider, la temperaturi de la 2°C la 8°C, ferit de lumina.

#### **12. ATENȚIONARE SPECIALĂ**

##### **Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

Nu există.

##### **Precăutări speciale pentru utilizare**

- pasarile ce urmeaza a fi vaccinate trebuie sa fie sanatoase si sa nu fie expuse la conditii de stres ca: malnutritie, aglomeratie sau temperaturi excesive;
- vaccinurile vii sunt sensibile la lumina soarelui, caldura, substante dezinfecțante si detergenti; drept urmare nu se recomanda expunerea vaccinului la aceste conditii;
- asigurati doza recomandata;
- nu utilizati tablete din folii deteriorate si gaurite;
- nu pastrati vaccin reconstituit pentru administrarea lui intr-o zi ulterioara;
- tabletele din foliile deschise si vaccinul reconstituit trebuie utilizate imediat;
- Presati folia pentru eliberarea tabletei in apa fiarta si racita. Asigurati-vă de dizolvarea completa a tabletei, asteptati 1-2 minute si apoi amestecati usor pentru dispersia omogena a vaccinului.
- opriti orice tratament sau dezinfecție a apei de baut cu 24 ore inainte de vaccinare;
- asigurati-vă ca există suficiente adaptorii asa incat toate pasările vor avea acces la apa in acelasi timp;
- apa si adaptorile trebuie sa fie curate si fara urme de dezinfecțanti;
- nu incalziti solutia continand vaccinul;
- insetati pasarile prin oprirea sursei de apa cu 1-2 ore inainte de vaccinare;
- nu oferiti apa pana cand nu este consumat tot vaccinul.



### **Precăutii speciale pentru utilizare la animale**

Nu este cazul.

#### **Precăutii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

În caz de auto-administrare, auto-injectare, ingestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

#### **Utilizare în perioada în perioada de ouat**

##### **Păsări ouătoare:**

Nu sunt restricții.

#### **Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Studiile de siguranță și eficacitate au demonstrat că imunizarea puielor de găină cu produsul Tabic MB, conform recomandărilor de utilizare (la vîrstă de 10 – 12 zile), nu influențează negativ vaccinarea acestora cu alte vaccinuri în zile diferite (ex: vaccinarea contra bolii de Newcastle și bronșitei infecțioase la vîrstă de 4 zile cu rapel la vîrstă de 14 zile zile).

#### **Supradoxozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Vaccinul este sigur consecutiv administrării a 10 doze vaccinale la pui SPF.

#### **Incompatibilități**

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal (cu excepția apei utilizata pentru reconstituirea vaccinului).

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

### **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

### **15. ALTE INFORMAȚII**

Cutie carton x 1 folie din aluminiu 10 tablete de 100, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10000 doze

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

### ***INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE***

Importul, vânzarea, eliberarea și/sau utilizarea de TABIC M.B. este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, în conformitate cu politica națională referitoare la sănătatea animalelor. Orice persoană care intenționează să importe, să vândă, să elibereze și/sau să utilizeze TABIC M.B. trebuie să consulte autoritatea competență în domeniul a Statului Membru respectiv, referitor la politicile de vaccinare existente, înainte de a efectua importul, vânzarea, utilizarea și/sau furnizarea.

