



ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI



1. **DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**
TABIC VH- VACCIN VIU CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE

2. **COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

Substanță activă :

-Virusul pseudopestei aviare, tulpina VH min $10^{6.0}EID_{50}/doza$, max. $10^{6.8}EID_{50}/doza$

Excipienți: Pentru lista completa a excipientilor, vezi secțiunea 6.1

3. **FORMA FARMACEUTICĂ**

Tablete efervescente, pentru reconstituire cu apa.

4. **PARTICULARITĂȚI CLINICE**

4.1 **Specii țintă**

Găini (Pui broiler, puicute de reproducție, găini ouătoare până la 4 săptămâni înainte de începerea ouatului).

4.2 **Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Acest vaccin este indicat la pui broiler, pui de reproducție, găini ouătoare (până la 4 săptămâni înainte de începerea ouatului) pentru prevenirea bolii Newcastle.

Imunitatea se instalează în 15 zile și durează 42 zile.

4.3 **Contraindicații**

Nu există.

4.4 **Atenționări speciale, pentru fiecare specie țintă.**

Nu există.

4.5 **Precauții speciale pentru utilizare:**

- pasările ce urmează a fi vaccinate trebuie să fie sănătoase și să nu fie expuse la condiții de stres ca: malnutriție, aglomeratie sau temperaturi excesive;

-vaccinurile vii sunt sensibile la lumina soarelui, căldura, substanțe dezinfectante și detergenți; drept urmare nu se recomandă expunerea vaccinului la aceste condiții;

-asigurați dozajul recomandat; nu utilizați mai puțin vaccin decât cantitatea recomandată.

-nu utilizați tablete din folii deteriorate și găurite;

-nu păstrați vaccin reconstituit pentru administrarea lui într-o zi ulterioară;

-tabletele din foliile deschise și vaccinul reconstituit trebuie utilizate imediat;

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-administrare, auto-injecție, ingestie, contact cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați-i produsul sau eticheta. Vaccinul poate produce la om conjunctivite trecătoare (2-3) zile. A se evita contactul soluției vaccinale cu ochii operatorului.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal constând din ochelari de protecție, mască și mănuși.

4.6 **Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Fără reacții locale sau sistemice.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:



- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate).

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat și/sau în interval de 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea Tabic VH când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Pentru cele mai bune rezultate, puii broiler trebuie vaccinați la vârsta de 1 zi, la 9 zile și la 22 zile. Dacă presiunea infecțioasă este mare și sunt probleme în zona cu boala de Newcastle, se poate face a 4-a vaccinare, la vârsta de 33 zile, prin metoda apei de baut.

Consultați întotdeauna medicul veterinar pentru programul de vaccinare potrivit.

Acest vaccin poate fi administrat prin pulverizare, aerosoli, apă de baut sau picături în ochi.

Apasați folia pentru a elibera tableta în apă fiartă și răcită. Așteptați 1-2 minute și asigurați-vă că tableta este complet dizolvată, după care amestecați ușor pentru dispersia omogenă a vaccinului.

Volumul reconstituit (ml.):

Dozaj	Pulverizare*	Aerosol*	Picături în ochi**
1.000	50-300	100-150	30-50
2.000	100-600	200-300	60-100
2.500	125-750	250-375	75-125
5.000	250-1.500	500-750	150-250
10.000	500-3.000	1.000-1.500	300-500

*Cantitatea exactă de apă depinde de puterea de pulverizare a sprayului utilizat.

**Cantitatea exactă de apă depinde de tipul de pipetă utilizat.

Administrarea prin pulverizare și aerosoli:

Un pulverizator de tipul celor utilizate în grădina poate fi utilizat pentru pulverizarea puilor de o zi, imediat după ieșirea din ouă. Pentru păsări mai în vârstă, utilizați un aparat de pulverizare electric cu o sprayere mai uniformă; picăturile nu trebuie să fie mai mici de 100 micro-grame.

Pulverizatorul ce urmează să fie utilizat trebuie să fie testat în legătură cu timpul necesar pentru sprayerea cantității de apă recomandate.

Administrarea prin aerosoli:

Această metodă de administrare nu este recomandată pentru păsări mai tinere de 2 săptămâni și este recomandată numai pentru a doua vaccinare.

Sistemul electric de aerosoli trebuie să producă picături mici de 100 microni.

Aparatele și echipamentele utilizate pentru pulverizare și aerosoli trebuie să fie curățate utilizând apă fiartă, trecută prin toate orificiile.

Sistemele de pulverizare și aerosoli trebuie să fie menținute la 60-70 cm deasupra pasărilor.

Vaccinarea se face în liniște, în semiintineric, cu ventilația și căldura oprite.



Administrarea prin metoda "Apei de Baut":

Cantitatea exacta de apa depinde de varsta pasarilor, specia si conditiile climaterice.

Este recomandata reconstituirea cantitatii potrivite de tablete pentru vaccinare in 1/5 din volumul zilnic al apei de baut. Acest volum de apa continand vaccinul ar trebui consumat in 2-3 ore. Pentru neutralizarea clorului in apa de baut, utilizati un neutralizator de clor comercial conform instructiunilor de utilizare, sau adaugati 50 ml lapte smantant sau 5 g lapte praf la fiecare litru de apa. Dupa omogenizarea laptelui, asteptati 5 minute, apoi adaugati vaccinul. Adapatoarele si sistemele de curgere a apei de baut trebuie sa fie curatate cu cateva zile inainte de vaccinare cu otet (in concentratie de 0.5-0.8%) sau cu acid citric (200-300 g/1.000 L).

Administrarea prin metoda "Picaturilor in ochi":

Tableta trebuie dizolvata in apa fiarta si racita, 1.000 doze de vaccin in 30-50 ml apa (cantitatea exacta de apa depinde de tipul picuratorului utilizat).

Se pune in ochi o picatura de vaccin.

PROGRAMUL DE VACCINARE

Pentru **broiler:**

1 zi – Tabic VH, intraocular.

9 zile – Tabic VH, prin spray sau metoda apei de baut.

22 zile- Tabic VH, prin spray sau metoda apei de baut.

-daca presiunea infectioasa este mare si sunt probleme in zona cu boala de Newcastle, se poate face a 4-a vaccinare, la varsta de 33 zile, prin metoda apei de baut.

Pentru **puicute de reproducție:**

1 zi – Tabic VH intraocular.

12 zile – VH inactivat

35-42 zile – Tabic VH prin spray.

98-112 zile – Tabic VH prin spray .

140-154 zile –VH inactivat.....

-diluarea vaccinului se va face cu un diluant steril.

Pentru **gani outoare :**

1 zi – Tabic VH intraocular.

12 zile VH inactivat.

28-42 – Tabic VH, prin spray.

90-110 zile VH inactivat

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Fără reacții local sau sistemice.

4.11 Timp de așteptare

0 zile.

5. PROPRIETĂȚI

Grupa farmacoterapeutică: vaccinuri virale vii, virusul bolii de Newcastle/paramyxovirus

Codul veterinar ATC: QI01AD06

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Bicarbonat de Sodiu, acid citric anhidru, povidona, magneziu stearat.

6.2 Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare



6.3 Perioadă de valabilitate

Perioadă de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare : 24 luni
Perioada de valabilitate pentru vaccinul reconstituit: administrare imediata.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C).
A se păstra în folia originala.
A se proteja de lumină.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Folii din aluminiu x 5 sau 10 tablete de 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10000 doze.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. ATICO INTERNATIONAL VETERINARY S.R.L.

Bdul. I.C. Bratianu, nr. 248

Constanta

ROMANIA

tel: 0241-512.369

fax: 0241-693.973

e-mail: office@atico.ro

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

28.12.2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Importul, vânzarea, eliberarea și/sau utilizarea de TABIC VH, VACCIN CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE, TULPINA VH - VIRUS VIU este sau poate fi interzisă în anumite State Membre, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, în conformitate cu politica națională referitoare la sănătatea animalelor. Orice persoană care intenționează să importe, să vândă, să elibereze și/sau să utilizeze TABIC VH, VACCIN CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE, TULPINA VH - VIRUS VIU trebuie să consulte autoritatea competentă în domeniu a Statului Membru respectiv, referitor la politicile de vaccinare existente, înainte de a efectua importul, vânzarea, utilizarea și/sau furnizarea.



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the top right corner of the page.

ANEXA III
ETICHETARE SI PROSPECT



A. ETICHETARE

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR
cutie x 1 folie din aluminiu x 5 sau 10 tablete

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
TABIC VH, VACCIN VIU CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

-substanța activă:

Virusul pseudopestei aviare, tulpina VH min. $10^{6.0}$ EID₅₀/doza- max. $10^{6.8}$ EID₅₀/doza

Excipienți:

Bicarbonat de sodiu.....0,16g, Acid citric anhidru.....0,35g ,
Providona.....0,035g , Magneziu stearat.....0,0025g

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Tablete efervescente, pentru reconstituire cu apa

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Folii din aluminiu x 5 sau 10 tablete de 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10000 doze.

5. SPECII ȚINTĂ

Gaini (Pui broiler, puicute de reproducție, gaini ouatoare până la 4 săptămâni înainte de începerea ouatului).

6. INDICAȚII

Acest vaccin este indicat la pui broiler, pui de reproducție, gaini ouatoare (până la 4 săptămâni înainte de începerea ouatului) pentru prevenirea bolii Newcastle.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Prin metoda "apei de baut", metoda "picaturilor în ochi", metoda prin "pulverizare" și aerosoli.
Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

0 zile.

9. ATENȚIONARE SPECIALĂ ,DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Perioada de valabilitate pentru vaccinul reconstituit: se recomandă administrare imediată.


11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C)

A se păstra în folia originală.

A se proteja de lumină.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ



Eliminare: cititi prospectul.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar
Se elibereaza pe baza de reteta veterinara.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA SI VEDEREA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. ATICO INTERNATIONAL VETERINARY S.R.L.
Bdul. I.C. Bratianu, nr. 248
Constanta
ROMANIA

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie:.....Lot:.....



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE FOLII

Tablet V.H, vaccin viu, tablete

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

TABIC VH, VACCIN VIU CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

SC ATICO INTERNATIONAL VETERINARY SRL

3. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}.....

4. NUMĂRUL SERIEI

Serie.....Lot.....

5. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.



**B. PROSPECT pentru
TABIC VH,
VACCIN VIU CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE**

- 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

S.C. ATICO INTERNATIONAL VETERINARY S.R.L.
Bdul. I.C. Bratianu, nr. 248
Constanta
ROMANIA

- 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR
TABIC VH, VACCIN VIU CONTRA PSEUDOPESTEI AVIARE**

- 3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE:**

Substanța activă:

-Virusul pseudopestei aviare, tulpina VH min. $10^{6.0}$ EID₅₀/doza- max. $10^{6.8}$ EID₅₀/doza

Excipienți:

Bicarbonat de sodiu,
Acid citric anhidru,
Povidona,
Magneziu stearat

- 4 INDICAȚII**

Acest vaccin este indicat la gâini : pui broiler, pui de reproducție, gâini ouătoare (pana la 4 săptămâni înainte de începerea ouatului) pentru prevenirea bolii Newcastle. Imunitatea se instalează în 15 zile și durează 42 zile.

- 5. CONTRAINDICAȚII**

Nu este cazul.

- 6. REACȚII ADVERSE**

Fără reacții locale sau sistemice .

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

- 7. SPECII ȚINTĂ**

Gâini (Pui broiler, puicute de reproducție, gâini ouătoare pana la 4 săptămâni înainte de începerea ouatului).

- 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:**



Pentru cele mai bune rezultate puii broiler trebuie vaccinati la varsta de 1 zi, la 9 zile si la 22 zile. Daca presiunea infectioasa este mare si sunt probleme in zona cu boala de Newcastle, se poate face a 4-a vaccinare, la varsta de 33 zile, prin metoda apei de baut.

Consultati intotdeauna medicul veterinar pentru programul de vaccinare potrivit.

Acest vaccin poate fi administrat prin pulverizare, aerosoli, apa de baut sau picaturi in ochi.

Apasati folia pentru a elibera tableta in apa fiarta si racita. Asteptati 1-2 minute si asigurati-va ca tableta este complet dizolvata, dupa care amestecati usor pentru dispersia omogena a vaccinului.

Volumul reconstituit (ml.):

Dozaj	Pulverizare*	Aerosol*	Picaturi in ochi**
1.000	50-300	100-150	30-50
2.000	100-600	200-300	60-100
2.500	125-750	250-375	75-125
5.000	250-1.500	500-750	150-250
10.000	500-3.000	1.000-1.500	300-500

*Cantitatea exacta de apa depinde de puterea de pulverizare a sprayului utilizat.

**Cantitatea exacta de apa depinde de tipul de pipeta utilizat.

Administrarea prin pulverizare si aerosoli:

Un pulverizator de tipul celor utilizate in gradina poate fi utilizat pentru pulverizarea puilor de o zi, imediat dupa iesirea din oua. Pentru pasari mai in varsta, utilizati un aparat de pulverizare electric cu o sprayere mai uniforma; picaturile nu trebuie sa fie mai mici de 100 micro-grame.

Pulverizatorul ce urmeaza a fi utilizat trebuie sa fie testat in legatura cu timpul necesar pentru sprayerea cantitatii de apa recomandate.

Administrarea prin aerosoli:

Aceasta metoda de administrare nu este recomandata pentru pasari mai tinere de 2 saptamani si este recomandata numai pentru a doua vaccinare

Sistemul electric de aerosoli trebuie sa produca picaturi mici : 100 micrometri.

Aparatele si echipamentele utilizate pentru pulverizare si aerosoli trebuie sa fie curatate utilizand apa fiarta trecuta prin toate orificiile.

Sistemele de pulverizare si aerosoli trebuie sa fie mentinute la 60-70 cm deasupra pasarilor.

Vaccinarea se face in liniste, in semiintineric, cu ventilatia si caldura oprite.

Administrarea prin metoda "Apei de Baut":

Cantitatea exacta de apa depinde de varsta pasarilor, specia si conditiile climaterice.

Este recomandata reconstituirea cantitatii potrivite de tablete pentru vaccinare in 1/5 din volumul zilnic al apei de baut. Acest volum de apa continand vaccinul ar trebui consumat in 2-3 ore. Pentru neutralizarea clorului in apa de baut utilizati un neutralizator de clor comercial conform instructiunilor de folosire, sau adaugati 50 ml lapte degresat sau 5 g lapte degresat praf la fiecare litru de apa. Dupa omogenizarea laptelui, asteptati 5 minute, apoi adaugati vaccinul. Adaptoarele si sistemele de curgere a apei de baut trebuie sa fie curatate cu cateva zile inainte de vaccinare, cu otet (in concentratie de 0.5-0.8%) sau cu acid citric (200-300 g/1.000 L).

Administrarea prin metoda "picaturilor in ochi":

Tableta trebuie dizolvata in apa fiarta si racita, 1.000 doze de vaccin in 30-50 ml apa (cantitatea exacta de apa depinde de tipul picuratorului utilizat).

Se pune in ochi o picatura de vaccin.

PROGRAMUL DE VACCINARE

Pentru broiler:

1 zi – Tabcic VH, intraocular.

9 zile – Tabcic VH, prin spray sau metoda apei de baut.

22 zile- Tabcic VH, prin spray sau metoda apei de baut.

-daca presiunea infectioasa este mare si sunt probleme in zona cu boala de Newcastle, se poate face a 4-a vaccinare, la varsta de 33 zile, prin metoda apei de baut.

Pentru puicute de reproducie:

1 zi – Tabcic VH intraocular.



12 zile – VH inactivat.
35-42 zile – Tabic VH prin spray.
98-112 zile – Tabic VH prin spray.
140-154 zile –VH inactivat
-diluarea vaccinului se va face cu un diluant steril.

Pentru **gâini outoare:**

1 zi – Tabic VH intraocular.
12 zile –VH inactivat.
28-42 – Tabic VH, prin spray.
90-110 zile – Tabic VH inactivat.

9. **RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

-Opriti orice tratament sau dezinfectie a apei de baut cu 24 de ore înainte de vaccinare;
-Asigurați-va ca sunt suficiente adapatoare pentru ca toate pasarile sa aiba acces la apa in acelasi timp;
-Apa si adaptorile trebuie sa fie curate si fara urme de dezinfectant;
-Solutia vaccinuala trebuie sa fie utilizata imediat;
-Insetati pasarile prin oprirea sursei de apa cu 1-2 ore inainte de vaccinare;
-Asigurați-va ca solutia vaccinuala este la dispozitia tuturor pasarilor si ca este consumata in 1-2 ore;
-Nu puneti la dispozitia pasarilor apa de baut inainte de consumul intregii solutii vaccinuale;
-Adaugati 50 ml lapte smantanit sau 5 g lapte praf la 1L apa pentru neutralizarea clorului sau alte reziduuri de dezinfectant.

10. **TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

11. **PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C)
A se păstra în folia originala.
A se proteja de lumină.
A nu se lăsa la îndemână si vederea copiilor.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe folie.
Dupa reconstituire se recomanda administrarea imediata.

12. **ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Precauții speciale pentru utilizare

Pasarile ce urmeaza a fi vaccinate trebuie sa fie sanatoase si sa nu fie expuse la conditii de stres ca: malnutritie, aglomeratie sau temperaturi excesive;
Vaccinurile vii sunt sensibile la lumina soarelui, caldura, substante dezinfectante si detergenti; drept urmare nu se recomanda expunerea vaccinului la aceste conditii;
Asigurați dozajul recomandat; nu utilizati mai puțin vaccin decat cantitatea recomandata.
Nu utilizati tablete din folii deteriorate si gaurite;
Nu pastrati vaccin reconstituit pentru administrarea lui într-o zi ulterioara;
Tabletele din foliile deschise si vaccinul reconstituit trebuie utilizate imediat;

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-administrare, auto-injectare, ingestie, contact cu pielea, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați-i produsul sau eticheta. Vaccinul poate produce la om conjunctivite trecătoare (2-3) zile. A se evita contactul solutiei vaccinuale cu ochii operatorului.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal constând din ochelari de protecție, masca si manusi.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat și/sau în interval de 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune



Nu există informații disponibile referitoare la siguranță și eficacitatea Tabic VH când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz. .

A nu se amesteca cu alte produse medicinale veterinare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Fără reacții locale sau sistemice.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
03.2017

15. ALTE INFORMAȚII

Folii din aluminiu x 5 sau 10 tablete de 1000, 2000, 2500, 5000 sau 10000 doze.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

