



PROSPECT

TIAGEN 10%

-SOLUTIE ORALA pentru porci si pasari (broileri).
- Uz veterinar -

- 1. NUMELE SI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE SI A DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS**

DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C.CRIDA PHARM S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, nr.2, Bloc 101, Ap.47, Parter, Sector 6, București, România.

PRODUCĂTOR PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Punct de lucru Oltenița, Str.Stadionului, Nr. 1, Jud. Călărași.

- 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**
TIAGEN 10% ,solutie orala pentru porci si pasari (broileri).

3. DECLARAREA SUBSTANTEI ACTIVEI SI A ALTOR INGREDINTI:

100 ml produs contine :

tiamulin hidrogen fumarat 10g
excipient: propilen glicol , apa ad 100 ml

4. INDICATII:

La broileri: in prevenirea si tratarea bolii respiratorii cronice, micoplasmoza si artrita infectioasa.

La porci: in prevenirea si tratarea dizenteriei anaerobe, pneumoniei enzootice a porcului, infectiilor produse de micoplasme, infectiilor secundare produse de germeni sensibili la tiamulin.

5. CONTRAINDICATII:

Nu se administrează la ierbivore.

Nu se administrează la animalele sensibile la tiamulin.

Nu se administreaza la pasarile ale caror oua sunt destinate consumului uman.

6. REACTII ADVERSE:

Ocazional, pot aparea eriteme si alte reactii de hipersensibilitate.


7. SPECII TINTĂ: porc si pasare (broiler).

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE:

Tratamentul consta in administrarea produsului Tiagen 10%, pe cale orala, individual sau masal (prin incorporare in apa de baut), timp de 3-7 zile consecutiv, in doze diferite, in functie de specie, varsta, greutate corporala, stare fiziologica si stare de sanatate. Pentru tratamentul masal, in apa de baut, recomandam calcularea corecta a greutatii vii totale si a cantitatii de produs ce trebuie administrata, precum si prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corecta.

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA:

La porci: trebuie asigurata o doza de 8 –10 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 0.08-0.1ml Tiagen 10 % /kg g.v./zi.



tegoria	10-20 kg	21-40 kg	41-60 kg	61-80 kg	81-100 kg	Scroafe inainte si dupa nastere	Scroafe in lactatie	Vieri
Cantitate de apa ingerata zilnic	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Tiagen 10% (litri/1000 litri apa)	1 L	1 L	1,1 L	1,3 L	1,4 L	1,7 L	0,8 L	2 L

- **La pasare (broileri):** trebuie asigurata o doza de 15 -20 mg s.a. / kg g.v. / zi. respectiv 0.15-0.2 ml Tiagen 10% kg .gv. / zi.

TEGORIA	Broiler 0-14 zile	Broiler 15 - 28 zile	Broiler 29 - 35 zile
Tiagen 10% (ml /1000 litri apa)	500 ml	1000 ml	1200 ml

10. TIMP DE ASTEPTARE:

Carne porc: 6 zile
Carne pasare (broileri): 5 zile

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A nu se lasa la îndemâna copiilor.
A se pastra în intervalul de temperatură 18 – 25 °C.
A nu se refrigera sau congela.
A se ferii de îngheț.
A se păstra în ambalajul original.
A se proteja de lumină.
A se păstra în loc uscat.
A se proteja de lumina directă.
A nu se utilizeaza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Nu există.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deseurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.
Medicamentele nu trebuie aruncate in ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:

15. ALTE INFORMATII:

IMOD DE PREZENTARE:

Produsul este ambalat in flacoane de 50 ml , 100 ml , 250 ml, 500 ml , 1000 ml si canistre de 5 litri, 10 litri, 20 litri.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținatorului autorizației de comercializare.

Rugam însoțiiți orice reclamație cu numărul seriei înscris pe eticheta.





SUMARUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. NUMELE PRODUSULUI VETERINAR:

TIAGEN 10%, solutie orala pentru suine si pasari (broileri)

2. COMPOZITIE CALITATIVA SI CANTITATIVA:

100 ml produs contine :

tiamulin hidrogen fumarat 10g

pentru lista completa a excipientilor vezi sectiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solutie orala.

4. INFORMATII CLINICE:

4.1. Speciile tinta:

- pasare (broileri), porc:

4.2. Indicatii de utilizare la speciile tinta:

La broileri: in prevenirea si tratarea bolilor respiratorii cronice, micoplasmoza si artrita infectioasa.

La porci: in prevenirea si tratarea dizenteriei anarobe, pneumoniei enzootice a porcului, infectiilor produse de micoplasme, infectiilor secundare produse de germeni sensibili la tiamulin.

Tiamulin face parte din grupa de antibiotice pleuromutiline. Este un bacteriostatic, inhiband sinteza proteinelor bacteriene prin legarea sa la unitatea ribozomala 50S.

Tiamulinul este activ împotriva germenilor din genul *Mycoplasma*: (*Mycoplasma gallisepticum*, *M.sinoviae*, *M.meleagridis*, *M.hyopneumoniae*, *M.hyorhinis*, *M.hysosynoviae*), *Treponema hyodisenteriae*, leptospire, germeni Gram-pozitivi (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium perfringens*, *Listeria monocytogenes*, *Erysipelotrix* spp., *Corynebacterium pyogenes*), Gram-negativi (*Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp, *Klebsiella pneumoniae*.)





4.3. Contraindicatii:

Nu se administreaza la ierbivore.

Nu se administreaza la animalele sensibile la tiamulin.

Nu se administreaza la pasarile ale caror oua sunt destinate consumului uman.

4.4. Precautii speciale pentru fiecare specie tinta:

La pasare si porc nu se administreaza impreuna cu monensin, narasin, salinomicin. In cazul in care animalele nu ingereaza o cantitate suficienta de hrana care sa le asigure medicatia vor trebui tratate parenteral.

4.5. Precautii speciale de utilizare:

i) Precautii speciale de utilizare la animale:

Utilizarea produsului se va baza pe teste specifice de confirmare a bolii.

ii) Precautii speciale pentru personalul care administreaza produsul:

Tiamulinul poate cauza iritarea tractului respirator si ochii in caz de inhalare sau contact.

Trebuie luate masuri corespunzatoare de protectie in timpul incorporarii produsului in furaj si/sau cand este administrat in apa. Personalul lucrator trebuie sa poarte ochelari de protectie si masca. In caz de contact cu ochii acestia se vor spala cu apa si sapun.

Nu se va fuma, bea sau manca in timpul manipularii produsului.

4.6. Reactii adverse:

Ocasional, pot aparea eriteme si alte reactii de hipersensibilitate.

4.7. Utilizare in perioada de gestatie si ouat

Nu se administreaza.

4.8. Interactiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interactiune:

Nu se administreaza in asociere cu monensin, narasin, salinomicin.





4.9. Cantitati de administrat si calea de administrare:

Tratamentul consta in administrarea produsului Tiagen 10%, pe cale orala, individual sau masal (prin incorporare in apa de baut), timp de 3-7 zile consecutiv, in doze diferite, in functie de specie, varsta, greutate corporala, stare fiziologica si stare de sanatate. Pentru tratamentul masal, in apa de baut, recomandam calcularea corecta a greutatii vii totale si a cantitatii de produs ce trebuie administrata, precum si prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corecta.

- **La porci:** trebuie asigurata o doza de 8 –10 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 0.08-0.1 ml Tiagen 10 % /kg g.v./zi.

Categoria	10-20 kg	21-40 kg	41-60 kg	61-80 kg	81-100 kg	Scroafe inainte si dupa nastere	Scroafe in lactatie	Vieri
Cantitate de apa ingerata zilnic	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Tiagen 10% (litri/1000 litri apa)	1 L	1 L	1,1 L	1,3 L	1,4 L	1,7 L	0,8 L	2 L

Broileri: trebuie asigurata o doza de 15 -20 mg s.a. / kg g.v. / zi. respectiv 0.15-0.2 ml Tiagen 10% kg .gv. / zi.

CATEGORIA	Broiler 0 - 14 zile	Broiler 15 - 28 zile	Broiler 29 - 35 zile
Tiagen 10% (ml /1000 litri apa)	500 ml	1000 ml	1200 ml

4.10. Supradozare:

In caz de supradoza simptomele sunt: salivare, voma si letargie.

4.11. Timp de asteptare

carne:

Pasare (broiler) : 5 zile
Porci : 6 zile

5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE:

Grupa farmacoterapeutica: grupa de antibiotice pleuromutiline.

Clasificare ATC (vet) : QJ01XX92





5.1. Proprietati farmacologice:

Tiamulin face parte din grupa de antibiotice pleuromutiline. Este un bacteriostatic, inhiband sinteza proteinelor bacteriene prin legarea sa la unitatea ribozomala 50S.

Tiamulinul este activ împotriva germenilor din genul *Mycoplasma*: (*Mycoplasma gallisepticum*, *M.sinoviae*, *M.meleagridis*, *M. hyopneumoniae*, *M.hyorhinis*, *M.hysynoviae*), *Treponema hyodisenteriae*, leptospire, germeni Gram-pozitivi (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium perfringens*, *Listeria monocytogenes*, *Erysipelotrix* spp., *Corynebacterium pyogenes*), Tiamulin.

Mod de actiune

Tiamulinul inhiba sinteza proteinelor microbiale prin formarea unui complex care impiedica elongarea lantului polipeptidic.

Specie	MIC ₉₀ (µg/ml)	Resistenta	
<i>Brachyspira hyodysenteriae</i>	1		> 4 (R)
<i>M.Mycoplasma hyopneumoniae</i>	0,05	≤4 (S)	≥32 (R)

Rezistenta:

Rezistenta incruisata cu tilozina.

5.2 Proprietati farmacocinetice

Tiamulinul la o doza terapeutica administrata la porc atinge o concentratie plasmatica ce nu depaseste 1 µg/ml, iar T_{max} se situeaza intre 2 si 4 ore. Este rapid absorbit in tractul intestinal si biodisponibilitatea este de 85%.

Este distribuit in ficat, muschi si continutul intestinal. Tiamulinul este metabolizat pe mai multe cai (N-dezalchilare, monohidroxilare, etc.). In ficat, metabolitii au o slaba activitate antimicrobiana.





Eliminarea se realizeaza prin urina si fecale (aprox. 60% din doza orala este eliminata prin bila) . Cea mai mare concentratie de reziduuri de tiamulin va fi regasita in ficat.

Considerand iepurii ca o specie minora, nu au fost efectuate studii speciale, s-a considerat ca nu sunt diferente mari de metabolism intre alte specii si iepuri si s-au utilizat datele prin extrapolare.

6. PROPRIETATI FARMACEUTICE:

6.1. Lista excipientilor:

Propilen glicol, apa ;

6.2. Incompatibilitati:

Nu se administreaza in asociere cu monensin, narasin, salinomicin.

6.3. Valabilitate

2 ani de la data fabricarii.

Valabilitate dupa desfacerea ambalajului original : 180 zile.

Valabilitatea dupa recostituire in solutie apoase : 48 ore;

6.4. Precautii speciale de depozitare:

A nu se lasa la îndemâna copiilor.

A se pastra în intervalul de temperatură 18 – 25 °C.

A nu se refrigera sau congele.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

6.5. Natura si compositia ambalajului:

Flacoane PE albe, mate.

Produsul este ambalat in flacoane de 50 ml , 100 ml , 250 ml, 500 ml , 1000 ml si canistre de 5 litri, 10 litri, 20 litri.



Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deseurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate in ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

7. PRODUCATOR

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Stadionului nr. 1 Oltenita, Judetul Calarasi , 915400

Tel. +40 024 251 5005

Fax.+40 024 252 5925

Bucuresti, ROMANIA.

Fabrica:

Str. Stadionului nr. 1 Oltenita, Judetul Calarasi , 915400


Tel. +40 024 251 5005

Fax.+40 024 252 5925

8. AUTORIZATIA DE COMERCIALIZARE

9. DATA REINOURII AUTORIZATIEI

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI



**INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR
INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR**

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

TIAGEN 10%,SOLUTIE ORALA pentru suine si pasari (broileri).

1. DECLARAREA SUBSTANTELOR ACTIVE SI A ALTOR SUBSTANTE

100g produs contine 10 grame tiamulin hidrogen fumarat , propilen glicol, apa

3. FORMA FARMACEUTICA

Solutie orală

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Produsul este ambalat in flacoane de 50 ml , 100 ml , 250 ml, 500 ml , 1000 ml si canistre de 5 litri, 10 litri, 20 litri.

5. SPECII TINTĂ

Porci, păsări (broileri).

6. INDICATIE (INDICATII)

La broileri: in prevenirea si tratarea bolii respiratorii cronice, micoplasmoza si artrita infectioasa.


La porci: in prevenirea si tratarea dizenteriei anarobe, pneumoniei enzootice a porcului, infectiilor produse de micoplasme, infectiilor secundare produse de germeni sensibili la tiamulin.

7. MOD SI CALE DE ADMINISTRARE

Tratamentul consta in administrarea produsului Tiagen 10%, pe cale orala, individual sau masal (prin incorporare in apa de baut), timp de 3-7 zile consecutiv, in doze diferite, in functie de specie, varsta, greutate corporala, stare fiziologica si stare de sanatate. Pentru tratamentul masal, in apa de baut, recomandam calcularea corecta a greutatii vii totale si a cantitatii de produs ce trebuie administrata, precum si prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corecta.

- **La porci:** trebuie asigurata o doza de 8 –10 mg s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 0.08-0.1 ml Tiagen 10 % /kg g.v./zi.

Categoria	10-20 kg	21-40 kg	41-60 kg	61-80 kg	81-100 kg	Scroafe inainte si dupa nastere	Scroafe in lactatie	Vieri
Cantitate de apa ingerata zilnic	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Tiagen 10% (litri/1000litri apa)	1 L	1 L	1,1 L	1,3 L	1,4 L	1,7 L	0,8 L	





- **La broileri** trebuie asigurata o doza de 15 -20 mg s.a. / kg g.v. / zi.
respectiv 0.15-0.2 ml Tiagen 10% kg .gv. / zi.

CATEGORIA	Broiler 0 - 14 zile	Broiler 15 - 28 zile	Broiler 29 - 35 zile
Tiagen 10% (ml /1000 litri apa)	500 ml	1000 ml	1200 ml

8. CONTRAINDICATII:

Nu se administreaza la pasarile ale caror oua sunt destinate consumului uman.

9. TEMP DE AȘTEPTARE

carne:

Pasare (broileri) : 5 zile

Porci : 6 zile

10. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A se citi prospectul inainte de utilizare.

11. DATA EXPIRĂRII

2 ani de la data fabricarii;

Valabilitate dupa desfacerea ambalajului original; 180 zile

Valabilitate dupa reconstituirea in solutie apoasa : 48 ore.

12. CONDIȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în intervalul de temperatură 18 – 25 °C.

A nu se refrigeră sau congela.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumină.


A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina directă.

A nu se utilizeaza după data expirării marcată pe etichetă.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.





14. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR - se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

15. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.

16. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Intrarea Vagonetului, nr.2, Bloc 101, Ap.47, Parter, Sector 6, Bucuresti, Romania.

Tel. +40 024 251 5005

Fax.+40 024 252 5925

Bucuresti, ROMANIA.

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

Informații care trebuie înscrise pe ambalajul primar-

etichetarea produsului ambalat in flacoane de 50 ml , 100 ml , 250 ml, 500 ml , 1000 ml si canistre de 5 litri, 10 litri, 20 litri, contine toate datele prezentate mai sus.

Vezișot
In. BURNEA
D. BURNEA

