

**PROSPECT**  
**TYLOPLUS20% PULBERE SOLUBILA PENTRU SUINE SI BROILERI**

1. **NUMELE SI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE SI A DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE FABRICARE,RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS**

**DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

**S.C.CRIDA PHARM S.R.L.** Str. Intrarea Vagonetului, nr.2, Bloc 101, Ap.47, Parter, Sector 6, Eucuresti, România.

**PRODUCĂTOR PENTRU ELIBERAREA SERIEI**

Punct de lucru Oltenița, Str.Stadionului, Nr. 1, Jud. Calarași.

2. **DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**  
**TYLOPLUS 20% PULBERE SOLUBILA PENTRU SUINE SI BROILERI**

3. **DECLARAREA SUBSTANTEI ACTIVE SI A ALTOR INGREDINTI:**

100 g produs contine : Tilmicosin fosfat 20 g si dextroza.

4. **INDICATII:**

*La broileri:* este recomandat in prevenirea si tratarea infectiilor respiratorii asociate cu Mycoplasma gallisepticum si M. sinoviae.

*La suine:* este recomandat in prevenirea si tratarea infectiilor respiratorii asociate cu Actinobacillus pleuropneumoniae si Pasteurella multocida .

5. **CONTRAINDICATII:**

Se va evita accesul cailor la furajele si apa de baut care contin tilmicosin.

Nu se administreaza in furajele care contin bentonita. Bentonita poate afecta eficacitatea tilmicosinului.

Nu se administreaza mai mult de 21 de zile.

Nu se administreaza gainilor ouatoare, care produc oua pentru consum uman.


6. **REACTII ADVERSE:**

Nu e cazul.

7. **SPECII ȚINTĂ:** suine și broileri.

8. **POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE:**

Produsul Tyloplus 20% se administreaza oral, individual sau masal ( prin incorporare in hrana sau apa de baut) in diferite doze in functie de specie, varsta, greutate corporala, stare fiziologica si sanatate.



- La suine: trebuie asigurata o doza de 8-20 mg tilmicosin s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 40-100 mg Tyloplus 20% /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsă între 7-10 zile.

CATEGORIA	10-20 kg	21-40 Kg	41-60 Kg	61-80 Kg	81-100 kg	Scroafe și scroafe înaintate și după montă.	Scroafe în lactație.	
Necesar zilnic de apă	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Tyloplus 20% (gr/1000 L apa)	1000 g	1000 g	1100 g	1300 g	1400 g	1700 g	800 g	2000 g
Necesar zilnic furaj	0,7 kg	1,4 kg	2,2 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,2 kg	5,5 kg	3,0 kg
Tyloplus 20% (gr/ t furaj)	2100 g	2100 g	2300 g	2600 g	3000 g	4000 g	2550 g	5000 g

- La broileri: trebuie asigurata o doza de 10-25 mg tilmicosin s.a. / kg g.v., respectiv 50-125 mg Tyloplus /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsa între 3- 5 zile.

CATEGORIA	Broiler 0 - 14 zile	Broiler 15 - 28 zile	Broiler 29 - 35 zile
Tyloplus 20% (gr/1000 L apa)	300 g	600 g	750 g
Tyloplus 20% (gr/ t furaj)	600 g	1200	1500 g

**9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:**

Pentru tratamentul masel realizat prin administrare în apa de baut, recomandam o calculare corectă a greutății corporale și a cantității de produs ce trebuie administrat, iar pentru administrare în furaj trebuie avută în vedere o corectă omogenizare.

**10. TIMP DE AȘTEPTARE:**

Carne suine 12 zile  
Carne pasări: 14 zile

**11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:**


- A nu se lăsa la îndemana copiilor.
- A se păstra în intervalul de temperatură 18 – 25 °C.
- A nu se refrigera sau congela.
- A se feri de îngheț.
- A se păstra în ambalajul original.
- A se păstra în loc uscat.
- A se proteja de lumina directă.
- A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

**12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):**

Nu există.

**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:**

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.  
Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.  
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.





**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:**


**15. ALTE INFORMAȚII:**

**MOD DE PREZENTARE:**

Produsul este ambalat în pungi de 50 g, 100 g, 1 kg, 5 kg, și saci de 10 kg, 25 kg și 50 kg.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.  
Rugăm însoțiți orice reclamație cu numărul seriei înscris pe etichetă.

*Verificat  
Dr. GEFINCA  
Johanna*





## SUMARUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

**1. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:**  
TYLOPLUS 20% pulbere solubila pentru broileri si suine.

**2. COMPOZITIE CALITATIVA SI CANTITATIVA:**

**100 grame de produs contine:**

*Substanta activa:*

tilmicosin fosfat 20 g

*Pentru lista completa a excipientilor, vezi sectiunea 6.1.*

**3. FORMA FARMACEUTICA:**

Fulbere solubila.

Se prezinta sub forma de pulbere omogena de culoare alb-galbuie, cu miros caracteristic.

**4. PARTICULARITATI CLINICE:**

**4.1. Speciile tinta:**

- broileri, suine:


**4.2. Indicatii de utilizare la speciile tinta:**

**Pentru suine:** Tyloplus 20% este recomandat pentru prevenirea si tratamentul bolilor respiratorii asociate cu *Actinobacillus pleuropneumoniae* si *P. multocida*.

**Pentru broileri:** este recomandat pentru prevenirea si tratamentul bolilor respiratorii asociate cu *Mycoplasma gallisepticum* si *M. sinoviae*.

**4.3. Contraindicatii:**


Se va evita accesul cailor la hrana sau apa care contine tilmicosin;



Nu se va administra in hrana ce contine bentonite care pot influenta eficienta tilmicosinului.

Nu se va administra mai mult de 21 de zile.

Nu se va administra gainilor ale caror oua sunt destinate consumului uman.



#### 4.4. Precautii speciale pentru fiecare specie tinta:

Siguranta tilmicosinului nu a fost stabilita pentru vieri. In timpul perioadei de gestatie si lactatie nu se recomanda tratamentul.

#### 4.5. Precautii speciale de utilizare:

##### i) Precautii speciale de utilizare la animale:

Utilizarea produsului se va baza pe teste specifice de confirmare a bolii.

##### ii) Precautii speciale pentru personalul care administreaza produsul:

Tilmicosinul poate cauza iritarea tractului respirator si ochii in caz de inhalare sau contact.

Trebuie luate masuri corespunzatoare de protectie in timpul incorporarii produsului in furaj si/sau cand este administrat in apa.

Personalul lucrator trebuie sa poarte ochelari de protectie si masca. In caz de contact cu ochii acestia se vor spala cu apa si sapun.

Nu se va fuma, bea sau manca in timpul manipularii produsului.

#### 4.6. Reactii adverse:

Nu e cazul.

#### 4.7. Utilizare in perioada de gestatie si ouat:

Nu se administreaza.





#### 4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu se administrează în hrana care conține bentonită.

#### 4.9. Cantități de administrat și calea de administrare:

Produsul **Tyloplus 20%** se administrează oral, individual sau masal (prin incorporare în hrana sau apa de băut) în diferite doze în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și sănătate.


Pentru tratamentul masal realizat prin administrare în apa de băut, recomandăm o calculare corectă a greutății corporale și a cantității de produs ce trebuie administrat, iar pentru administrare în furaj trebuie avută în vedere o corectă omogenizare.

**La suine:** trebuie asigurată o doză de 8-20 mg tilmicosin s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 40-100 mg Tyloplus 20% /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsă între 7-10 zile.

CATEGORIA	10-20 kg	21-40 Kg	41-60 Kg	61-80 Kg	81-100 kg	Scroafe și scroafe înaintate și după montă.	Scroafe în lactație.	Vieri
Necesar zilnic de apă	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Tyloplus 20% (gr/1000 L apă)	1000 gr	1000 gr	1100 gr	1300 gr	1400 gr	1700 gr	800 gr	2000 gr
Necesar zilnic furaj	0,7 kg	1,4 kg	2,2 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,2 kg	5,5 kg	3,0 kg
Tyloplus 20% (gr/ t furaj)	2100 gr	2100 gr	2300 gr	2600 gr	3000 gr	4000 gr	2550 gr	5000 gr

**La broileri:** trebuie asigurată o doză de 10-25 mg tilmicosin s.a. / kg g.v., respectiv 50-125 mg Tyloplus /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsă între 3- 5 zile.

CATEGORIA	Broiler 0 - 14 zile	Broiler 15 - 28 zile	Broiler 29 - 35 zile
Tyloplus 20% (gr/1000 L apă)	300 g	600 g	750 g
Tyloplus 20% (gr/ t furaj)	600 g	1200 g	1500 g



#### 4.10. Supradozare:

Nu au fost inregistrate simptome de supradozare.

#### 4.11. Timp de asteptare:

Broileri: 12 zile

Suine : 14 zile

### 5. PROPRIETATI FARMACOLOGICE:

Grupa farmacoterapeutica: antibiotice din grupa macrolidelor.

Clasificare ATC (vet) : QJ01FA91

#### 5.1 Proprietati farmacodinamice:



Tilmicosinul este un antibiotic de semisinteza din grupa macrolidelor si afecteaza sinteza proteinelor bacteriene. Este considerat a fi un bacteriostatic dar la concentratii mai mari are actiune bactericida.


Tilmicosinul are un spectrul larg in -vitro, predominant contra microorganismelor Gram -pozitive, dar are si actiune sigura contra microorganismelor Gram-negative. Deasemenea a fost demonstrata si activitatea sa contra mai multor specii de mycoplasma.

#### 5.2 Proprietati farmacokinetice:

##### Absortie:

Cand a fost administrat la suine pe cale orala la o doza de 400 ppm in hrana ( echivalentul a 21.3 mg/kg/zi) tilmicosinul trece rapid din ser in zonele unde pH-ul are valori mai joase. Maximul de concentratie in ser ( $0.23 \pm 0.03 \mu\text{g/ml}$ ) a fost inregistrat in cea de a 10 zi de medicatie insa concentratii peste limita de cuantificare ( $0.10 \mu\text{g/ml}$ ) nu s-a regasit in 3 din totalul de 20 de animale examinate. Concentratiile in plamani a crescut rapid intre ziua a 2-a si ziua a 4-a si nu s-au mai observat schimbari semnificative in urmatoarele patru zile de tratament. Concentratie maxima de  $2.59 \pm 1.01 \text{ ppm}$  a fost regasita in plamani in cea de a 10 zi de tratament.





### Distributie:

Dupa o administrare orala, tilmicosinul s-a distribuit in tot corpul , dar cele mai mari concentratii sunt regasite in special in plamani si macrofagii din tesuturile plamanilor. Deasemenea este distribuit si in tesuturile ficatului si rinichilor.

### Biotransformare:

Se formeaza mai multi metaboliți , iar cei predominanti au fost identificati ca T1. O mare cantitate de tilmicosin a fost excretata fara sa sufere modificari.

### Eliminare:

In urma unei administrari orale, tilmicosinul a fost excretat in principal prin bila in fecale , iar o mica cantitate a fost eliminata prin urina.

## **6.Particularitati farmaceutice:**

### **6.1.Lista excipientilor:**

Dextroza

### **6.2. Incompatibilitati:**

Nu se va adminnistra in hrana ce contine bentonite.

### **6.3. Valabilitate**

2 ani de la data fabricari.

Valabilitate dupa desfacerea ambalajului original : 28 zile.

Valabilitatea dupa reconstituire in solutie apoase : 24 ore;

Valabilitate dupa incorporare in furaj : 28 zile

### **6.4. Precautii speciale de depozitare:**


A nu se lasa la îndemana copiilor.

A se pastra în intervalul de temperatură 18 – 25 °C.

A nu se refrigera sau congela.


A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.





A se păstra în loc uscat.  
A se proteja de lumina directă.  
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.



6.5. Natura și compoziția ambalajului:

Pungi cu 50g, 100 g, 1 kg, 5 kg, și saci cu 10 kg, 25 kg and 50 kg din material PET met 12μ/PE 70.

6.6. Precauții speciale pentru eliminarea produsului medicinal veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse :

Produsul medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile provenite din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

7. DETINATORUL AUTORIZAȚIEI DE  
COMERCIALIZARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Intrarea vagonetului nr 2. Bl 101, ap47. Sector 6 Bucuresti.

Tel. +40 024 251 5005

Fax. +40 024 252 5925

Bucuresti, ROMANIA.

8. NUMARUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/ REAUTORIZĂRI

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

11. INTERDICȚII PENTRU VANZARE, ELIBERARE  
ȘI SAU UTILIZARE

Nu este cazul.

*Verificat*  
*Dr. Mihail*  
*2017*

INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR  
INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR  
CUTIE DE CARTON, PUNGI x 50g, 100g, 1kg, 5kg

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

TYLOPLUS 20% pulbere solubila pentru suine si broileri.

2. DECLARAREA SUBSTANTELOR ACTIVE SI A ALTOR SUBSTANTE

100g produs contine 20 grame TILMICOSIN FOSFAT si dextroza

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere solubila

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Produsul este ambalat in pungi de 50g, 100g, 1kg, 5kg

5. SPECII ŢINTĂ

Suine, broileri.

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

**Pentru suine:** Tyloplus este recomandat pentru prevenirea si tratamentul bolilor respiratorii asociate cu *Actinobacillus pleuropneumoniae* si *P. multocida*.

**Pentru broileri:** este recomandat pentru prevenirea si tratamentul bolilor respiratorii asociate cu *Mycoplasma gallisepticum* si *M. sinoviae*.

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Produsul Tyloplus 20% se administreaza oral, individual sau masal ( prin incorporare in hrana sau apa de baut) in diferite doze in functie de specie, varsta, greutate corporala, stare fiziologica si sanatate.

- Pentru tratamentul masal realizat prin administrare in apa de baut, recomandam o calculare corecta a greutatii corporale si a cantitatii de produs ce trebuie administrat, iar pentru administrare in furaj trebuie avuta in vedere o corecta omogenizare.
- La suine: trebuie asigurata o doza de 8-20 mg tilmicosin s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 40-100 mg Tyloplus 20% /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsă între 7-10 zile.
- 

CATEGORIA	10-20 kg	21-40 Kg	41-60 Kg	61-80 Kg	81-100 kg	Scroafe și scrofițe înainte și după montă.	Scroafe în lactație.	Vieri
Necesar zilnic de apă	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Tyloplus 20% (gr/1000 L apa)	1000 g	1000 gr	1100 g	1300 g	1400 g	1700 g	800 g	2000 g
Necesar zilnic furaj	0,7 kg	1,4 kg	2,2 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,2 kg	5,5 kg	3,0 kg
Tyloplus 20% (gr/ t furaj.)	2100 g	2100 gr	2300 g	2600 g	3000 g	4000 g	2550 g	5000 g

- La broileri: trebuie asigurata o doza de 10-25 mg tilmicosin s.a. / kg g.v., respectiv 50-125 mg Tyloplus 20 % /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsa între 3- 5 zile.



CATEGORIA	Broiler 0 - 14 zile	Broiler 15 - 28 zile	Broiler 29 - 35 zile
<i>Tyloplus 20%</i> (gr/1000 L apa)	300 g	600 g	750 g
<i>Tyloplus 20%</i> (gr/ t furaj.)	600 g	1200 g	1500 g

### 8. CONTRAINDICATII:

Evitati accesul cailor la hrana sau apa care contine tilmicosin;  
 Nu se administreaza in hrana ce contine bentonite care pot influenta eficienta tilmicosinului.  
 Nu se va administra mai mult de 21 de zile.  
 Nu se va administra gainilor ale caror oua sunt destinate consumului uman.

### 9. TIMP DE AȘTEPTARE

Broileri : 12 zile  
 Suine : 14 zile

### 10. ATENȚIONĂRI SPECIALE


A se citi prospectul inainte de utilizare.

### 11. DATA EXPIRĂRII

2 ani de la data fabricarii;  
 Valabilitate dupa desfacerea ambalajului original; 28 zile  
 Valabilitate dupa reconstituirea in solutie apoasa : 24 ore.  
 Valabilitate dupa incorporare in furaj :28 zile.

### 12. CONDITII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se pastra în intervalul de temperatură 18 – 25 °C.  
 A nu se refrigera sau congela.  
 A se feri de îngheț.  
 A se păstra în ambalajul original.  
 A se proteja de lumină.  
 A se păstra în loc uscat.  
 A se proteja de lumina directă.  
 A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.





13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR  
NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU  
RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR . Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

15. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

16. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE  
COMERCIALIZARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.  
Str. Intrarea Vagonetului, nr.2, Bloc 101, Ap.47, Parter, Sector 6, Bucuresti, România.  
Tel. +40 024 251 5005  
Fax.+40 024 252 5925  
Bucuresti, ROMANIA.

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

*Verificat*  
*Sr. BUCUREȘTI*  
*[Signature]*



**INFORMAȚII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR**  
**SACI x 10 kg, 25 kg si 50 kg**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

TYLOPLUS 20% pulbere solubila pentru suine si broileri.

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

100 grame de produs contine:

*Substanța activă:*

tilmicosin fosfat 20 g

excipienti: dextroza 80 g

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Pulbere solubila

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Produsul este ambalat in saci de 10 kg 25 kg si 50 kg.

**5. SPECII ȚINTĂ**

Suine, broileri.


**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

**Pentru suine:** Tyloplus este recomandat pentru prevenirea si tratamentul bolilor respiratorii asociate cu *Actinobacillus pleuropneumoniae* si *P. multocida*.

**Pentru broileri:** este recomandat pentru prevenirea si tratamentul bolilor respiratorii asociate cu *Mycoplasma gallisepticum* si *M. sinoviae*.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

- Produsul Tyloplus 20% se administreaza oral, individual sau masal ( prin incorporare in hrana sau apa de baut) in diferite doze in functie de specie, varsta, greutate corporala, stare fiziologica si sanatare.
- Pentru tratamentul masal realizat prin administrare in apa de baut, recomandam o calculare corecta a greutatii totale si a cantitatii de produs ce trebuie administrat, iar la prepararea premixurilor trebuie avuta in vedere o corecta omogenizare.
- **La suine:** trebuie asigurata o doza de 8-20 mg tilmicosin s.a. / kg g.v. / zi, respectiv 40-100 mg Tyloplus 20% /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsă intre 7-10 zile.



CATEGORIA	10-20 kg	21-40 Kg	41-60 Kg	61-80 Kg	81-100 kg	Scroafe și scroafe înaintea și după montă.	Scroafe în lactație.	Vieri
Necesar zilnic de apă	1-2 L	2-4 L	4-5 L	5-6 L	6-7 L	7-8 L	15-20 L	7-8 L
Tyloplus 20% (gr/1000 L apa)	1000 g	1000 gr	1100 g	1300 g	1400 g	1700 g	800 g	2000 g
Necesar zilnic furaj	0,7 kg	1,4 kg	2,2 kg	2,7 kg	3,0 kg	3,2 kg	5,5 kg	3,0 kg
Tyloplus 20% (gr/ t furaj.)	2100 g	2100 gr	2300 g	2600 g	3000 g	4000 g	2550 g	5000 g

➤ La broileri: trebuie asigurată o doză de 10-25 mg tilmicosin s.a. / kg g.v., respectiv 50-125 mg Tyloplus 20 % /kg g.v./zi, durata tratamentului fiind cuprinsă între 3- 7 zile.

CATEGORIA	Broiler 0 - 14 zile	Broiler 15 - 28 zile	Broiler 29 - 35 zile
Tyloplus 20% (gr/1000 L apa)	300 g	600 g	750 g
Tyloplus 20% (gr/ t furaj.)	600 g	1200 g	1500 g

### 8. TIMP DE AȘTEPTARE

Broileri : 12 zile

Suine : 14 zile

### 9. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

### 10. DATA EXPIRĂRII

2 ani de la data fabricării;

Valabilitate după deschiderea ambalajului original :28 zile

Valabilitate după reconstituirea în soluție apoasă :24 ore.

Valabilitatea după incorporare în furaj :28 zile

### 11. CONDIȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în intervalul de temperatură 18 – 25 °C.

A nu se refrigera sau congela.

A se feri de îngheț.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra în loc uscat.


A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Valabilitate după desfacerea ambalajului original : 28 zile.

Valabilitatea după reconstituire în soluție apoasă : 24 ore;

Valabilitate după incorporare în furaj :28 zile





12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR  
NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU  
RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR . Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR”

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE  
COMERCIALIZARE

S.C. CRIDA PHARM S.R.L.

Str. Intrarea Vagonetului, nr.2, Bloc 101, Ap.47, Parter, Sector 6, Bucuresti, România.

Tel. +40 024 251 5005

Fax.+40 024 252 5925

Bucuresti, ROMANIA.

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

*Verificat*  
*Dr. G. G. G. G. G.*  
*[Signature]*

