



## PROSPECT

### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul avizului de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

SC VANELLI SRL  
Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10  
Iasi, 707410-RO  
Tel.: +40 232 253 442  
Fax: +40232 253 456  
e-mail: [office@vanellivet.ro](mailto:office@vanellivet.ro),  
[www.vanellivet.ro](http://www.vanellivet.ro)

### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

**VANMECTIN SMALL ANIMAL, 5 mg/ml, soluție spot on pentru porumbei, iepuri, păsări de colivie, rozătoare mici, dihorii**

Ivermectină

### 3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)

1 ml soluție spot on conține:

**Substanța activă:**

Ivermectină 5 mg


**Excipienti:** glicerol formal, propilenglicol

### 4. INDICAȚII

Tratamentul ectoparazitozelor la **porumbei, păsări de colivie**, produse de: căpușe (Dermanyssus spp), păduchi malofagi (Lipeurus spp, Columbicola spp), pureci (Ctenocephalides spp), ploșnițe, acarieni ai pielii și penelor (Syringophylus spp, Analges spp), râia picioarelor (Cnemidocoptes mutans) râia deplumantă a corpului (Cnemidocoptes levis), râia laminosioptică (tesut conjunctiv subcutanat) (Laminosioptes cysticola);

Tratamentul ectoparazitozelor la **iepuri, dihorii, rozătoare mici**, în tratamentul râiei produsă de: Psoroptes spp, Sarcoptes spp, Notoedres spp, Demodex spp, Otodectes spp. Produsul are acțiune și asupra unor nematode la păsări: Ascaridia spp, Capillaria spp, Syngamus trachea și nematode din familia trichostrongilidelor (Trichostrongylus spp, Hyostrongylus spp, Amidostomum spp).





## **5. CONTRAINDICAȚII**

A nu se utilizeaza la animalele altele decat cele pentru care este indicat.

Nu se trateaza puii sub varsta de o luna.

A se evita contactul produsului cu ochii animalelor..

Nu se utilizeaza la porumbeii si iepurii destinati consumului uman.

Nu se utilizeaza in cazurile de hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipienti.

## **6. REACTII ADVERSE**

Reactii severe, inclusiv cazuri de mortalitate, au fost inregistrate la caini (in special la cei din rasele Collie, Old English Sheep Dogs si rasele inrudite), broastele testoase tratate cu produse care contin substanta activa.

Daca observati orice reactie adversa, chiar si cele care nu sunt deja incluse in acest prospect sau credeti ca medicamentul nu a avut efect va rugam sa informati medicul veterinar.

## **7. SPECII INTA**

Porumbei, iepuri, pasari de colivie, rozatoare mici, dihorii.

## **8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE**

Se administreaza extern, prin aplicare spot on.

Doza recomandata este de 0,2 mg ivermectina / kg greutate corporala, echivalent cu 2 picaturi produs / kg greutate corporala.

## **9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA**

Nu utilizati produsul daca observati semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar

## **10. TIMP DE ASTEPTARE**

Nu este cazul

## **11. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lasa la vederea si indemana copiilor.

Produsul se pstreaza la loc uscat, intunecos la temperaturi mai mici de 25°C.



A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):**

**Precautii speciale de utilizare:**

**Precautii speciale de utilizare la animale:**

Nu se va utiliza la păsările și animalele cunoscute cu hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți.

**Precautii speciale care trebuie luate de catre persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale:**

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la ivermectină trebuie să evite contactul cu produsul.

La manipularea produsului se recomandă purtarea mănușilor. Spălați bine mâinile după utilizarea produsului.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta.

**Interactiuni cu alte produse medicinale veterinare si alte forme de interactiune:**

Nu se cunosc.

## **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ.**

Toxic pentru pești și animale acvatice.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## **14. DATE IN BAZA CARORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL**


Noiembrie 2017

## **15. ALTE INFORMATII**

**Dimensiuni de ambalaj:**

Flacon din HDPE cu picurător din LDPE și bușon din HDPE x 25 ml, 50 ml, 120 ml.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.





## ETICHETA-PROSPECT

### **1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul avizului de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

SC VANELLI SRL  
Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10  
Iasi, 707410-RO  
Tel.: +40 232 253 442  
Fax: +40232 253 456  
e-mail: [office@vanellivet.ro](mailto:office@vanellivet.ro),  
[www.vanellivet.ro](http://www.vanellivet.ro)

### **2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**VANMECTIN SMALL ANIMAL, 5 mg/ml, soluție spot on pentru porumbei, iepuri, păsări de colivie, rozătoare mici, dihorii**

Ivermectină

### **3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)**

1 ml soluție spot on conține:

**Substanță activă:**


Ivermectină 5 mg

**Excipienti:** glicerol formal, propilenglicol

### **4. INDICAȚII**

Tratamentul ectoparazitozelor la **porumbei, păsări de colivie**, produse de: căpușe (*Dermanyssus spp*), păduchi malofagi (*Lipeurus spp*, *Columbicola spp*), pureci (*Ctenocephalides spp*), ploșnițe, acarieni ai pielii și penelor (*Syringophylus spp*, *Analges spp*), râia picioarelor (*Cnemidocoptes mutans*) râia deplumantă a corpului (*Cnemidocoptes levis*), râia laminosioptică (țesut conjunctiv subcutanat) (*Laminostrongylus cysticola*);

Tratamentul ectoparazitozelor la **iepuri, dihorii, rozătoare mici**, în tratamentul râiei produsă de: *Psoroptes spp*, *Sarcopetes spp*, *Notoedres spp*, *Demodex spp*, *Otodectes spp*. Produsul are acțiune și asupra unor nematode la păsări: *Ascaridia spp*, *Capillaria spp*, *Syngamus trachea* și nematode din familia trichostrongilidelor (*Trichostrongylus spp*, *Hyostrongylus spp*, *Amidostomum spp*).



## 5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utilizeaza la animalele altele decat cele pentru care este indicat.  
Nu se trateaza puii sub varsta de o luna.  
A se evita contactul produsului cu ochii animalelor..  
Nu se utilizeaza la porumbeii si iepurii destinati consumului uman.  
Nu se utilizeaza in cazurile de hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipienti.

## 6. REACTII ADVERSE

Reactii severe, inclusiv cazuri de mortalitate, au fost inregistrate la caini (in special la cei din rasele Collie, Old English Sheep Dogs si rasele inrudite), broastele testoase tratate cu produse care contin substanta activa.

Daca observati orice reacție adversa, chiar si cele care nu sunt deja incluse in acest prospect sau credeti ca medicamentul nu a avut efect va rugam sa informati medicul veterinar.

## 7. SPECII INTA

Porumbei, iepuri, pasari de colivie, rozatoare mici, dihorii.

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE

Se administreaza extern, prin aplicare spot on.

Doza recomandata este de 0,2 mg ivermectina / kg greutate corporala, echivalent cu 2 picaturi produs / kg greutate corporala.

## 9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTA

Nu utilizati produsul daca observati semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar

## 10. TIMP DE ASTEPTARE

Nu este cazul

## 11. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lasa la vedere si indemana copiilor.



Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos la temperaturi mai mici de 25°C.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

## **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ.**

Toxic pentru pești și animale acvatice.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## **13. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):**

**Precautii speciale de utilizare:**

**Precautii speciale de utilizare la animale:**

Nu se va utiliza la păsările și animalele cunoscute cu hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți.

**Precautii speciale care trebuie luate de catre persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale:**

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la ivermectină trebuie să evite contactul cu produsul.

La manipularea produsului se recomandă purtarea mănușilor. Spălați bine mâinile după utilizarea produsului.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta.

**Interactiuni cu alte produse medicinale veterinar si alte forme de interactiune:**

Nu se cunosc.

## **14. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA**

Numai pentru uz veterinar.


## **15. NUMARUL AVIZULUI DE COMERCIALIZARE**

## **16. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

< Serie> < Lot> < BN>{număr}

## **17. DATE IN BAZA CARORA A FOST APROBATA ULTIMA DATA ETICHETA--PROSPECTUL**

Noiembrie 2017




## 18. ALTE INFORMATII

### Dimensiuni de ambalaj:

Flacon din HDPE cu picurător din LDPE și bușon din HDPE x 50 ml, 120 ml

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținatorului autorizației de comercializare.





**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

Flacon din HDPE cu picurator din LDPE și bușon din HDPE x 25 ml

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

VANMECTIN SMALL ANIMAL, 5 mg/ml, soluție spot on pentru porumbei, iepuri, păsări de colivie, rozătoare mici, dihorii

Ivermectina

**2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)**

Ivermectină 5 mg /ml

**3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

25 ml

**4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE**

Se administreaza extern, prin aplicare spot on.

**5. TEMP (TEMPI) DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

**6. NUMĂRUL SERIEI**

< Serie> < Lot> {număr}

**7. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

După deschidere se va utiliza în timp de 6 luni.

**8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.





## INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton x 1 flacon x 25 ml

### 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

**VANMECTIN SMALL ANIMAL**, 5 mg/ml, soluție spot on pentru porumbei, iepuri, păsări de colivie, rozătoare mici, dihorii

Ivermectină

### 2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

1 ml soluție spot on conține:

Ivermectină 5 mg

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție spot on

### 4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 flacon x 25ml

### 5. SPECII ȚINTĂ

Porumbei, iepuri, păsări de colivie, rozătoare mici, dihorii

### 6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Tratamentul ectoparazitozelor la porumbei, păsări de colivie, produse de: căpușe (*Dermanyssus* spp), păduchi malofagi (*Lipeurus* spp, *Columbicola* spp), pureci (*Ctenocephalides* spp), ploșnițe, acarieni ai pielii și penelor (*Syringophylus* spp, *Analges* spp), râia picioarelor (*Cnemidocoptes mutans*) râia deplumantă a corpului (*Cnemidocoptes levis*), râia laminosioptică (țesut conjunctiv subcutanat) (*Laminosioptes cysticola*);

Tratamentul ectoparazitozelor la iepuri, dihorii, rozătoare mici, în tratamentul râiei produsă de: *Psoroptes* spp, *Sarcoptes* spp, *Notoedres* spp, *Demodex* spp, *Otodectes* spp. Produsul are acțiune și asupra unor nematode la păsări: *Ascaridia* spp, *Capillaria* spp, *Syngamus trachea* și nematode din familia trichostrongilidelor (*Trichostrongylus* spp, *Hyostrongylus* spp, *Amidostomum* spp).

### 7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citii prospectul înainte de utilizare.

IEI • Boala de la caini si pisici  
DE LA VETERINAR

Se administreaza extern, prin aplicare spot on.

Doza recomandata este de 0,2 mg ivermectina / kg greutate corporala, echivalent cu 2 picaturi produs / kg greutate corporala.

#### **8. TEMP DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

#### **9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Citiți prospectul înainte de utilizare.

#### **10. DATA EXPIRĂRII**

EXP {lună/an}

După deschidere, se utilizează în timp de 6 luni.

#### **11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos la temperaturi mai mici de 25°C.

#### **12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Eliminarea: cititi prospectul produsului.

Toxic pentru pești și animale acvatice.

#### **13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz**

Numai pentru uz veterinar.

#### **14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”**

A nu se lăsa la vedere si îndemâna copiilor.

#### **15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE**

SC Vanelli srl.

Șos. Iași-Tg-Frumos, km. 10, România

Iași, 707410

Tel.:+ 40 232 253 442

Fax: + 40 232 253 456

E-mail: [office@vanellivet.ro](mailto:office@vanellivet.ro)

[www.vanellivet.ro](http://www.vanellivet.ro)





**16. NUMĂRUL (NUMERELE) AVIZULUI DE COMERCIALIZARE**

**17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

<Serie> < Lot> {număr}

A handwritten signature or mark, possibly "G. G. G.", located at the bottom center of the page.