

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vetmedin 5 mg capsule pentru câini



2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 capsulă conține:

Substanță activă:

Pimobendan 5 mg

Excipienți :

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule.

Capsule gelatinoase tari, alungite, cu înveliș opac portocaliu și corp opac alb.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Câini.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Tratamentul insuficienței cardiace congestive la câine, cu origine în cardiomiopatia dilatativă sau insuficiența valvulară (mitrală și / sau regurgitarea tricuspidă).

4.3 Contraindicații

Nu trebuie utilizat în cazuri de cardiomiopatie hipertrofică sau condiții clinice în care o creștere a randamentului cardiac nu este posibilă, din cauze funcționale sau anatomice (de exemplu stenoza aortică).

Deoarece pimobendanul este metabolizat în principal în ficat, nu trebuie utilizat la câini cu disfuncție hepatică severă.

Vezi, de asemenea, pct. 4.7.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingerare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul sau eticheta produsului. Spălați-vă pe mâini după utilizare.

af

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Un efect cronotrop pozitiv moderat și voma pot apărea în cazuri rare.

Totuși, aceste efecte sunt dependente de doză și pot fi evitate prin reducerea dozei în aceste cazuri.

În cazurile rare, s-a observat diaree tranzitorie, anorexie sau letargie.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat.

În studiile cu șobolani și iepuri pimobendanul nu a avut nici un efect asupra fertilității și efectele embriotoxice s-au produs numai la doze maternotoxice. În experimentele pe șobolani s-a demonstrat că pimobendanul se excretă în lapte. Administrați la cățelele gestante și care alăptează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil (vezi, de asemenea, pct. 4.3).

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

În studiile farmacologice nu a fost detectată nici o interacțiune între glicozidul cardiac ouabain și pimobendan. Creșterea contractilității inimii indusă de pimobendan este atenuată, în prezența antagonistului de calciu (de exemplu verapamil) și β -antagonistului (de exemplu propranolol).

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Pentru administrarea pe cale orală, în doze de la 0,2 mg la 0,6 mg pimobendan / kg de greutate corporală pe zi. Doza zilnică recomandată este de 0,5 mg pimobendan / kg greutate corporală. Doza trebuie să fie împărțită în două administrări (0,25 mg / kg fiecare), o jumătate din doză de dimineață și cealaltă jumătate la aproximativ 12 ore mai târziu. Fiecare doză trebuie administrată cu cel puțin o oră înainte de hrănire.

Vetmedin capsule poate fi combinat cu un tratament diuretic, cum ar fi furosemid.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), dacă este necesar

În caz de supradozare, trebuie inițiat tratamentul simptomatic.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: stimulente cardiace (inhibitori fosfodiesterazici)

Cod ATCvet : QC01CE90

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Pimobendan, un derivat de benzimidazol-piridazinonă, este o substanță non-simpatomimetică, non-glicozid inotropică cu proprietăți puternic vasodilatatoare.

Pimobendan își exercită efectul de stimulator miocardic printr-un dublu mecanism de acțiune: creșterea sensibilității la calciu a miofilamentelor cardiace și inhibarea fosfodiesterazei (III). De asemenea, prezintă un efect vasodilatator printr-o acțiune inhibitoare asupra activității fosfodiesterazei III.



5.2 Particularități farmacocinetice

Absorbție:

După administrarea pe cale orală de Vetmedin capsule biodisponibilitatea absolută a principiului activ este de 60 - 63%. Deoarece această biodisponibilitate este considerabil redusă atunci când pimobendan este administrat cu alimente sau la scurt timp după aceea, se recomandă tratarea animalelor cu aproximativ 1 oră înainte de hrănire.

Distribuție:

Volumul distribuției este de 2,6 l / kg, indicând faptul că pimobendan este ușor distribuit în țesuturi. Media legării de proteinele plasmatică este de 93%.

Metabolizare:

Compusul este oxidativ demetilant pentru principalul sau metabolit activ (UD-CG 212). Căile metabolice ulterioare sunt compuși faza II UD-CG 212, în esență glucuronizi și sulfați.

Eliminare:

Timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminarea pimobendanului este $0,4 \pm 0,1$ ore, în concordanță cu un clearance înalt de 90 ± 19 ml / min / kg, și o medie de menținere scurtă de $0,5 \pm 0,1$ ore. Principalul metabolit activ este eliminat în plasmă, cu o eliminare/înjumătățire plasmatică de $2,0 \pm 0,3$ ore. Aproape întreaga doză se elimină prin materiile fecale.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Acid citric anhidru
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Celuloză microcristalină
Povidonă
Stearat de magneziu
Gelatină
Dioxid de titan (E171)
Galben sunset FCF (E110),.

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate


Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.


6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperaturi peste 25 ° C.
A se păstra flaconul bine închis pentru a se proteja de umiditate.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din HDPE albă cu un sistem de închidere ce nu poate fi deschis de copii conținând 100 capsule, într-o cutie de carton pliabilă.





6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim am Rhein, Germania

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

110196

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: 24.03.2005
Data reînnoirii autorizației: 16.08.2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI





ETICHETAREA



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie de carton pentru flacon conținând 100 capsule

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vetmedin 5 mg capsule pentru câini

~~Pimobendan~~

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Pimobendan 5 mg/capsulă

3. FORMA FARMACEUTICĂ

~~Capsule~~

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 capsule.

5. SPECII ȚINTĂ

~~Câini~~

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală.

~~Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.~~

8. TIMP DE AȘTEPTARE

~~Nu este cazul.~~

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ(E), DUPĂ CAZ

~~Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.~~

10. DATA EXPIRĂRII

EXP (lună/an)

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 ° C.

A se păstra flaconul bine închis pentru a se proteja de umiditate.



12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: Citiți prospectul produsului.

13. MENȚIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR" ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA "AN NU SE LASA LA VEDEREA ȘI INDEMANA COPIILOR

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim am Rhein, Germania

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

110196

17. NUMARUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot (număr)

GP

INFORMAȚII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon conținând 100 capsule

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vetmedin 5 mg capsule pentru câini

~~Pimobendan~~

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Pimobendan 5 mg/capsulă

3. FORMA FARMACEUTICĂ

~~Capsule~~

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 capsule.

5. SPECII ȚINTĂ

~~Câini~~

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

~~Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.~~

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală.

~~Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.~~

8. TIMP DE AȘTEPTARE

~~Nu este cazul.~~

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ(E), DUPĂ CAZ

~~Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.~~

10. DATA EXPIRĂRII

EXP (lună/an)



11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 ° C.

A se păstra flaconul bine închis pentru a se proteja de umiditate.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

~~Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.~~

13. MENȚIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR" ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENȚIUNEA "A NU SE LASA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMANA COPIILOR

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Germania


16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

110196

17. NUMARUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot{număr}





PROSPECT

Vetmedin 5 mg capsule pentru câini

1. NUMELE ȘI ADRESA DE DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI, dacă sunt diferite

Deținătorului autorizației de comercializare:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim am Rhein, Germania

Producător pentru eliberarea seriei:

Klocke Pharma Service GmbH
77763 Appenweier, Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vetmedin 5 mg capsule pentru câini
Pimobendan

Capsule gelatinoase tari, alungite, cu înveliș opac portocaliu și corp opac alb.

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

1 capsulă conține:

Substanță activă (e):

Pimobendan 5 mg

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Tratamentul insuficienței cardiace congestive la câine, cu origine în cardiomiopatia dilatativă sau insuficiență valvulară (mitrală și / sau regurgitarea tricuspidă).

5. CONTRAINDICAȚII

Nu trebuie utilizat în cazuri de cardiomiopatie hipertrofică sau condiții clinice în care o creștere a randamentului cardiac nu este posibilă, din cauze funcționale sau anatomice (de exemplu stenoza aortică). Deoarece pimobendanul este metabolizat în principal în ficat, nu trebuie utilizat la câini cu disfuncție hepatică severă (vezi și Atenționări speciale).

6. REACȚII ADVERSE

Un efect cronotrop pozitiv moderat și voma pot apărea în cazuri rare. Totuși, aceste efecte sunt dependente de doză și pot fi evitate prin reducerea dozei în aceste cazuri. În cazuri rare, s-a observat diaree tranzitorie, anorexie sau letargie.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)



- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)



Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru administrarea pe cale orală, în doze de la 0,2 mg la 0,6 mg pimobendan / kg de greutate corporală pe zi. Doza zilnică recomandată este de 0,5 mg pimobendan / kg greutate corporală. Doza trebuie să fie împărțită în două administrări (0,25 mg / kg fiecare), o jumătate din doza de dimineață și cealaltă jumătate la aproximativ 12 ore mai târziu.

Fiecare doză trebuie administrată cu cel puțin o oră înainte de hrănire.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Vetmedin capsule poate fi combinat cu un tratament diuretic, cum ar fi furosemid.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25 ° C.

A se păstra flaconul bine închis pentru a se proteja de umiditate.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie / flacon.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

12. ATENȚIONARE(RI) SPECIALĂ(LE)

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingerare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul sau eticheta produsului. Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

În studiile cu șobolani și iepuri pimobendanul nu a avut nici un efect asupra fertilității. Efecte embriotoxice s-au produs numai la doze maternotoxice. În experimentele pe șobolani s-a demonstrat că pimobendanul se excretă în lapte. Administrați la cățelele gestante și care alăptează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil (vezi, de asemenea capitolul Contraindicații).

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

În studiile farmacologice nu a fost detectată nici o interacțiune între glicozidul cardiac ouabain și pimobendan. Creșterea contractilității inimii indusă de pimobendan este atenuată, în prezența antagonistului de calciu (ex. Verapamil) și β -antagonistului (ex. Propranolol).

Supradozare și simptome, proceduri de urgență, antidoturi), dacă este necesar
În caz de supradozare, trebuie inițiat tratamentul simptomatic.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. Data la care prospectul a fost aprobat

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiunea ambalajului: 100 capsule

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Animal Health
Dr. Boehringer Gasse 5-11
A-1121 Wien
Tel.: +43 (0) 1 80 105 0

