

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

XEDEN 50 mg comprimat pentru câini

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Un comprimat conține:

Substanță activă:

Enrofloxacina.....50,0 mg

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat

Comprimat marcat, în formă de trifoi, de culoare bej,

Comprimatul poate fi divizat în patru părți egale.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Câini

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

La câini:

- Tratamentul infecțiilor tractului urinar inferior (asociate sau nu cu prostatita) și infecțiilor tractului urinar superior cauzate de *Escherichia Coli* sau *Proteus mirabilis*.
- Tratamentul piidermitei superficiale și profunde.

4.3 Contraindicații

A nu se utiliza la câini tineri sau în creștere (câini cu vîrstă mai mică de 12 luni (rase mici) sau sub 18 luni (rase mari) deoarece produsul poate cauza modificări ale cartilajului epifizar la căile în creștere.

A nu se utilizala câini cu tulburări convulsive deoarece enrofloxacina poate cauza stimularea SNC.

A nu se utiliza la câini cu hipersensibilitate cunoscută la fluorochinolone sau la oricare dintre excipientii produsului.

A nu se utiliza în caz de rezistență la chinolone deoarece există rezistență încrucișată aproape completă față de alte chinolone și rezistență încrucișată completă față de alte fluorochinolone.

Vezi secțiunea 4.7 și 4.8.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Fluorochinolonele trebuie rezervate pentru tratamentul afecțiunilor clinice care au reacționat slab sau se așteaptă să răspundă slab față de alte clase de antimicrobiene.

Ori de câte ori este posibil, utilizarea fluorochinolonelor trebuie să se bazeze pe testarea suscepționalității.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor menționate în RCP poate cauza creșterea prevalenței rezistenței bacteriilor față de fluorochinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte chinolone datorită potentialului de rezistență încrucișată.

Politicele antimicrobiene locale și oficiale trebuie luate în considerare cand se utilizeaza produsul.

Utilizați produsul cu grijă la căini cu afectiuni grave hepatice sau renale.

Piodermita este de obicei secundara la o boala preexistenta. Este recomandat să se determine cauza primară și să se trateze animalul în consecință.

Comprimatele masticabile sunt aromate. Pentru a evita orice ingestie accidentală, pastrati comprimatele departe de animale.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la (fluoro)quinolone trebuie să evite orice contact cu produsul.

In cazul ingerării accidentale, solicitați urgent sfatul medicului și prezentați prospectul.

Spălați mâinile după manipularea produsului.

In cazul contactului cu ochii, spălați cu foarte multă apă.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Posibile alterări ale cartilajului articular la căii în creștere (vezi 4.3 contraindicații).

În cazuri rare se observă vomă și anorexie.

În cazuri rare pot apărea reacții de hipersensibilitate. În acest caz, administrarea produsului trebuie întreruptă.

Pot apărea semne neurologice (convulsii, tremor, ataxie, agitație).

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Utilizarea în timpul gestației:

Studiile de laborator efectuate pe animale de laborator (șobolan, șinșila) nu au demonstrat efect teratogen, fetotoxic sau maternotoxic.

A se utiliza numai după evaluarea raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar.

Utilizarea în timpul lactației:

Datorită faptului că enrofloxacina trece în laptele matern, utilizarea nu este recomandata in timpul lactatiei.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Utilizarea concomitentă cu flunixin trebuie făcută sub strictă supraveghere a medicului veterinar deoarece interacțiunile dintre aceste medicamente poate cauza efecte adverse datorită întârzierii eliminării din organism.

Administrarea concomitentă cu teofilina trebuie făcută sub strictă supraveghere a medicului veterinar deoarece pot crește nivelurile serice de teofilina.

Utilizarea concomitentă cu produse ce conțin magneziu sau aluminiu (cum ar fi antacide sau sucralfat) poate reduce absorbtia enrofloxacinei.

Aceste medicamente trebuie administrate cu o pauză de 2 ore între ele.

A nu se utiliza cu tetracicline, fenicoli sau macrolide, din cauza potențialelor efecte antagonice.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Utilizare orală.

5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală o dată pe zi, echivalent cu un comprimat pentru 10 kg, zilnic, timp de:

- 10 zile în infecțiile tractului urinar inferior

- 15 zile în infecțiile tractului urinar superior și în infecțiile tractului urinar inferior asociate cu prostatita
- Până la 21 zile în piodermita superficială depinzând de răspunsul clinic
- Până la 49 zile în piodermita profundă depinzând de răspunsul clinic

Tratamentul trebuie reconsiderat în cazul în care nu apar îmbunătățiri clinice până la jumătatea perioadei de tratament.

XEDEN 50 mg Numărul de comprimate pe zi	XEDEN 150 mg Numărul de comprimate pe zi	Greutatea câinelui (kg)
¼		≥ 2 - < 4
½		≥ 4 - < 6,5
¾	¼	≥ 6,5 - < 8,5
1	¼	≥ 8,5 - < 11
1 ¼	½	≥ 11 - < 13,5
1 ½	½	≥ 13,5 - < 17
	¾	≥ 17 - < 25
	1	≥ 25 - < 35
	1 ¼	≥ 35 - < 40
	1 ½	≥ 40 - < 50
	1 ¾	≥ 50 - < 55
	2	≥ 55 - < 65

Pentru a asigura o dozare corectă, se va determina greutatea corporală cât mai exact posibil, pentru a evita subdozarea.

Comprimatele sunt aromate și sunt bine acceptate de câini. Comprimatele pot fi administrate direct în gura câinelui sau simultan cu mâncarea, dacă este necesar.

Instrucțiuni privind modul de divizare al comprimatului: Puneți comprimatul pe o suprafață uniformă, cu partea marcată orientată în jos (cu partea convexă în sus). Cu vârful degetului arătător, exercitați o ușoară presiune verticală pe mijlocul comprimatului pentru a-l rupe de-a lungul lățimii sale în jumătăți. Apoi, pentru a obține sferturi, exercitați o ușoară presiune pe mijlocul unei jumătăți cu degetul arătător pentru a o rupe în două părți.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Supradozarea poate cauza vomă și semne nervoase (tremurături musculare, lipsă de coordonare și convulsi) care pot face necesară întreruperea tratamentului.

În absența unui antidot cunoscut, se aplică metode de eliminare a medicamentului și tratament simptomatic.

Dacă este necesar, administrarea de aluminiu sau magneziu conținuți de antacide sau carbon activat poate fi utilizată pentru a reduce absorbția enrofloxacinei.

Conform literaturii de specialitate, semne de supradozare cu enrofloxacină la câine, precum inapetență și tulburări gastrointestinale, au fost observate la aproximativ de 10 ori doza recomandată când a fost administrată două săptămâni.

Nu au fost observate semne de intoleranță la câinii la care s-a administrat de 5 ori doza recomandată timp de o lună.

4.11 Timp (Timpi) de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Codul veterinar ATC: QJ01MA90

Grupa farmacoterapeutică: Fluorochinolone

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Enrofloxacina este un antibiotic de sinteză aparținând grupei fluorochinolonelor care acționează prin inhibarea topoizomerazei II, o enzimă implicată în mecanismul replicării bacteriene.

Enrofloxacina exercită o activitate bactericidă dependentă de concentrație cu valori similare de concentrație minimă inhibitorie și concentrații minime bactericide. De asemenea posedă o activitate împotriva bacteriilor aflate în faza staționară prin alterarea permeabilității membranei celulare externe fosfolipidice a peretelui celular.

În general, enrofloxacina este activă față de un spectru larg de bacterii Gram-negative, în special față de Enterobacteriaceae.

Escherichia coli, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.* și *Enterobacter spp.* sunt în general sensibile.

Pseudomonas aeruginosa este variabil sensibilă și de obicei când este sensibilă are un MIC mai mare decât alte microorganisme sensibile.

Staphylococcus aureus și *Staphylococcus intermedius* sunt de obicei sensibile.

Streptococci, enterococci, bacteriile anaerobe pot fi considerate în general rezistente.

Inducerea rezistenței la quinolone poate fi dezvoltată prin mutații la nivelul genei giraza a bacteriei și prin schimbări ale permeabilității celulare pentru quinolone.

5.2 Particularități farmacocinetice

Enrofloxacina este metabolizată rapid pentru a forma un compus activ, ciprofloxacina.

După administrarea orală a XEDEN 50 (5 mg/kg) la câini:

- Concentrația maximă în plasmă de enrofloxacină (1,72 µg/ml) a fost observată la 1 ora de la administrare
- Concentrația maximă în plasmă de ciprofloxacină (0,32 µg/ml) a fost observată la 2 ore de la administrare

Enrofloxacina este excretată preponderent prin rinichi. O mare parte a substanței active și a metaboliștilor ei se găsesc în urină.

Enrofloxacina este în mare măsură distribuită în organism. Concentrațiile tisulare sunt de multe ori mai mari decât cele serice. Enrofloxacina trece de bariera hematoencefalica. Nivelul de legare a proteinei din ser este de 14% la câini. Timpul de înjunătărire în ser este de 3-5 ore la câini (5 mg/kg). Aproximativ 60% din doză este excretată sub formă de enrofloxacina neschimbata, iar restul sub formă de metaboliți, printre altele ciprofloxacina. Clearance-ul total este de aproximativ 9 ml/minut/kg greutate corporală la câini.

5.3 Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Nu este cazul.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Pulbere de ficat de porc
Drojdie
Celuloză microcristalină
Crocarmeloză sodică
Copovidonă
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Ulei de ricin hidrogenat
Lactoză monohidrat

6.2 Incompatibilități majore

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vanzare:
3 ani

Perioada de valabilitate a comprimatelor divizate: 72 ore

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumină.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții de temperatură speciale de pastrare.

Orice comprimate divizate trebuie returnate în blisterul original pentru pastrare.

Orice comprimate divizate, care raman dupa 72 de ore, trebuie eliminate.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Blister compus din: blistere din folie termosudata PVDC-TE-PVC/Aluminiu cu 10 comprimate/blister

Cutie de carton cu 1 blister x 10 comprimate

Cutie de carton cu 10 blistere x 10 comprimate

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Ceva Sante Animale România SRL,

Str Chindiei, Nr 5, Sector 4,

București 040185

Tel: (+4) 021 335 00 60

Fax: (+4) 021 335 00 52

ROMÂNIA

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

160323

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

19.11.2009/03.10.2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Septembrie 2021

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

ETICHETARE

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

XEDEN 50 mg comprimat pentru câini
Enrofloxacina

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Un comprimat conține:
Enrofloxacina.....50,0 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat
Comprimat marcat, în formă de trifoi, de culoare bej,
Comprimatul poate fi divizat în patru părți egale.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 x 10 comprimate
10 x 10 comprimate

5. SPECII ȚINTĂ

Câini

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

7. MOD ȘI CALE (CAI) DE ADMINISTRARE

Utilizare orala.
Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMPORIZARE (TEMPO)

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP: lună/an

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original.
A se proteja de lumină.
Pentru perioada de valabilitate a comprimatelor divizate: a se vedea prospectul.

Citiți prospectul înainte de utilizare.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: Citiți prospectul.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Ceva Sante Animale România SRL,
Str Chindiei, Nr 5, Sector 4,
București 040185
Tel: (+4) 021 335 00 60
Fax: (+4) 021 335 00 52
ROMÂNIA

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

160323

17. NUMĂRUL DE FABRICАȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot (serie):

ETICHETARE

BLISTER

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

XEDEN 50 mg comprimat pentru câini
Enrofloxacina

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE



3. DATA EXPIRĂRII

EXP : lună/an

4. NUMĂRUL SERIEI

Serie:

5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

bwest u. 4

PROSPECT

PROSPECT
XEDEN 50 mg comprimat pentru câini

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE
ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU
ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Detinătorul autorizației de comercializare

Ceva Sante Animale România SRL,
Str. Chindiei, Nr 5, Sector 4,
București 040185
Tel: (+4) 021 335 00 60
Fax: (+4) 021 335 00 52
ROMÂNIA

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Ceva Santé Animale
Boulevard de la Communication
Zone Autoroutière
53950 Louverné
FRANȚA

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

XEDEN 50 mg comprimat pentru câini
Enrofloxacina

**3. DECLARAAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR
INGREDIENTE (INGREDIENȚI)**

Un comprimat conține:
Enrofloxacina.....50,0 mg
Comprimat
Comprimat marcat, în forma de trifoi, de culoare bej

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

La câini:

- Tratamentul infecțiilor tractului urinar inferior (asociate sau nu cu prostatita) și infecțiilor tractului urinar superior cauzate de *Escherichia Coli* sau *Proteus mirabilis*.
- Tratamentul piodermitei superficiale și profunde

5. CONTRAINDIICAȚII

A nu se utiliza la câini tineri sau în creștere (câini cu vîrstă mai mică de 12 luni (rase mici) sau sub 18 luni (rase mari) deoarece produsul poate cauza modificări ale cartilajului epifizar la cățeii în creștere.
A nu se utiliza la câini cu tulburări convulsive deoarece enrofloxacina poate cauza stimularea SNC.
A nu se utiliza la câini cu hipersensibilitate cunoscută la fluorochinolone sau la oricare dintre excipienții produsului.

A nu se utiliza în caz de rezistență la chinolone deoarece există rezistență încrucișată aproape completă față de alte chinolone și rezistență încrucișată completă față de alte fluorochinolone.

Vezi secțiunea „Utilizare în perioada de gestație și lactație” și „Interacțiuni”.

6. REACTII ADVERSE

Possible alterări ale cartilajului articular la cateii în creștere (vezi 5. contraindicații).

În cazuri rare se observă voma și anorexie.

În cazuri rare pot apărea reacții de hipersensibilitate. În acest caz, administrarea produsului trebuie întreruptă.

Pot apărea semne neurologice (convulsii, tremor, ataxie, agitație).

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

Alternativ, puteți raporta prin intermediul sistemului național de raportare (farmacovigilenta@ansvs.ro).

7. SPECII ȚINTĂ

Câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare orală.

5 mg enrofloxacină/kg greutate corporală o dată pe zi, echivalent cu un comprimat pentru 10 kg, zilnic, timp de:

- 10 zile în infecțiile tractului urinar inferior
- 15 zile în infecțiile tractului urinar superior și în infecțiile tractului urinar inferior asociate cu prostatita
- Până la 21 zile în piodermita superficială depinzând de răspunsul clinic
- Până la 49 zile în piodermita profundă depinzând de răspunsul clinic

Tratamentul trebuie reconsiderat în cazul în care nu apar îmbunătățiri clinice până la jumătatea perioadei de tratament.

Comprimatul este divizibil și poate fi utilizat după cum urmează:

XEDEN 50 mg Numărul de comprimate pe zi	XEDEN 150 mg Numărul de comprimate pe zi	Greutatea câinelui (kg)
¼		≥ 2 - < 4
½		≥ 4 - < 6,5
¾	¼	≥ 6,5 - < 8,5
1	¼	≥ 8,5 - < 11
1 ¼	½	≥ 11 - < 13,5
1 ½	½	≥ 13,5 - < 17
	¾	≥ 17 - < 25
	1	≥ 25 - < 35
	1 ¼	≥ 35 - < 40
	1 ½	≥ 40 - < 50
	1 ¾	≥ 50 - < 55
	2	≥ 55 - < 65

Pentru a asigura o dozare corectă, se va determina greutatea corporală cât mai exact posibil, pentru a evita subdozarea.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Comprimatele sunt aromate și sunt acceptate de câini. Comprimatele pot fi administrate direct în gura câinului sau adăugate în mâncare, dacă este necesar.

Instrucțiuni privind modul de divizare al comprimatului: Punetă comprimatul pe o suprafață uniformă, cu partea marcată orientată în jos (cu partea convexă în sus). Cu vârful degetului arătător, exercitați o ușoară presiune verticală pe mijlocul comprimatului pentru a-l rupe de-a lungul lățimii sale în jumătăți. Apoi, pentru a obține sferturi, exercitați o ușoară presiune pe mijlocul unei jumătăți cu degetul arătător pentru a o rupe în două părți.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se proteja de lumină.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții de temperatură speciale de pastrare.

A nu se utilizează după data expirării înscrisă pe blister și cutie de carton.

Orice comprimate divizate trebuie returnate în blisterul original pentru pastrare.

Perioada de valabilitate a comprimatelor divizate: 72 ore

Orice comprimate divizate, care raman după 72 de ore, trebuie eliminate.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Fluorochinolonele trebuie rezervate pentru tratamentul afecțiunilor clinice care au răspuns slab sau se așteaptă să răspunda slab față de alte clase de antimicrobiene.

Ori de câte ori este posibil, utilizarea fluorochinolonelor trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor menționate în RCP poate cauza creșterea prevalenței rezistenței bacteriilor față de fluorochinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte chinolone datorită potentialului de rezistență încrucisată.

Politicele antimicrobiene locale și oficiale trebuie luate în considerare cand se utilizeaza produsul.

Utilizați produsul cu grijă la câini cu afecțiuni grave hepatice sau renale.

Piodermita este de obicei secundara la o boala preexistentă. Este recomandat să se determine cauza primară și să se trateze animalul în consecință.

Comprimatele masticabile sunt aromate. Pentru a evita orice ingestie accidentală, pastrati comprimatele departe de animale.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu o hipersensibilitate cunoscută la (fluoro)quinolone trebuie să evite orice contact cu produsul.

În cazul ingerării accidentale, solicitați urgent sfatul medicului și prezentați prospectul.

Spălați mâinile după manipularea produsului.

În cazul contactului cu ochii, spălați cu foarte multă apă.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Utilizarea în timpul gestației:

Studiile de laborator efectuate pe animale de laborator (șobolan, șinșila) nu au demonstrat efect teratogen, fetotoxic sau maternotoxic.

A se utiliza numai după evaluarea raportului beneficiu/risc de către medicul veterinar.

Utilizarea în timpul lactației:

Datorită faptului că enrofloxacina trece în laptele matern, utilizarea nu este recomandată în timpul lactației.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Utilizarea concomitentă cu flunixin trebuie făcută sub strictă supraveghere a medicului veterinar deoarece interacțiunile dintre aceste medicamente poate cauza efecte adverse datorită întârzierii eliminării din organism.

Administrarea concomitentă cu teofilina trebuie făcută sub strictă supraveghere a medicului veterinar deoarece pot crește nivelurile serice de teofilina.

Utilizarea concomitentă cu produse ce conțin magneziu sau aluminiu (cum ar fi antacide sau sucralfat) poate reduce absorbția enrofloxacinei. Aceste medicamente trebuie administrate cu o pauză de 2 ore între ele.

A nu se utilizează cu tetracicline, fenicoli sau macrolide, din cauza potențialelor efecte antagonice.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Supradozarea poate cauza vomă și semne nervoase (tremurături musculare, lipsă de coordonare și convulsii) care pot face necesară intreruperea tratamentului.

În absența unui antidot cunoscut, se aplică metode de eliminare a medicamentului și tratament simptomatic.

Dacă este necesar, administrarea de aluminiu sau magneziu conținuți de antacide sau carbon activat poate fi utilizată pentru a reduce absorbția enrofloxacinei.

Conform literaturii de specialitate, semne de supradozare cu enrofloxacina la câine, precum inapetență și tulburări gastrointestinale, au fost observate la aproximativ de 10 ori doza recomandată când a fost administrată două săptămâni.

Nu au fost observate semne de intoleranță la câinii la care s-a administrat de 5 ori doza recomandată timp de o lună.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminați deșeurile în conformitate cu prevederile locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Septembrie 2021

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiunile ambalajului:

Cutie de carton cu 1 blister x 10 comprimate

Cutie de carton cu 10 blistere x 10 comprimate

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.